



Juin 2025

# Une entrée dans l'algèbre par les nombres relatifs

**Parcours d'Etude et de Recherche  
sur l'enseignement des nombres  
relatifs au collège**



Groupe Didactique de l'Ires d'Aix-Marseille Université  
SOUS LA DIRECTION DE Y. MATHERON

*PER Enseignement des nombres relatifs au collège © 2025 by Groupe Didactique de l'Ires  
d'Aix-Marseille Université is licensed under Creative Commons Attribution-  
NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*

## Table des matières

UNE ENTREE DANS L'ALGEBRE PAR LES NOMBRES RELATIFS .....	3
INTRODUCTION .....	4
Quelques notions de théorie anthropologique du didactique.....	11
LE PARCOURS D'ETUDE ET DE RECHERCHE .....	13
<i>Première séquence</i> .....	14
<i>Deuxième séquence</i> .....	22
<i>Troisième séquence</i> .....	30
<i>Quatrième séquence</i> .....	37
<i>Cinquième séquence</i> .....	48
ANNEXE 1 .....	56
ANNEXE 2 .....	59

# UNE ENTREE DANS L'ALGEBRE PAR LES NOMBRES RELATIFS

## *Avertissement*

On trouvera, dans les pages qui suivent, une proposition de début de Parcours d'Etude et de Recherche (PER) sur les nombres relatifs : définition, ordre, addition et soustraction, multiplication. En tant que parcours, il englobe aussi la division et l'élevation à une puissance. Ces dernières parties ne figurent pas dans ce texte car sont encore soumises à expérimentation. Les contenus exposés dans ces pages ont été enseignés tels quels depuis plus d'une douzaine d'années dans de multiples classes, par des professeurs qui ont mis en œuvre ce type d'enseignement ; ce qui assure la robustesse de cette proposition.

*Néanmoins, pour pouvoir prendre en mains ce PER, il peut être utile de constituer pour soi-même des fiches sur lesquelles figureront les étapes indispensables et les points saillants à ne pas manquer lorsque cette forme d'enseignement se réalisera en classe. **Attention ! Si l'on change les valeurs des variables didactiques, on court le risque de ne pas obtenir les effets d'enseignement et d'apprentissage escomptés, voire d'obtenir l'inverse !***

Nous indiquons, à titre indicatif, le nombre de séances de 55 min que les professeurs consacrent en moyenne à l'enseignement de chacune des parties de ce PER. Cette durée moyenne a été établie à partir de son enseignement par divers professeurs, auprès d'une quinzaine de classes de divers niveaux (bonnes, moyennes, faibles), pendant cinq à six années scolaires. Il est évident que la passation de ce PER ne se fait pas de manière continue. Par exemple, les professeurs laissent un espace de temps d'environ deux mois entre la troisième et la quatrième séquence. De même, au cours de la passation de la première séquence, la première partie est constituée de calculs d'une durée très courte en début de séance ; le reste du temps de la séance doit être consacré à l'enseignement d'un autre thème du programme.

La proposition présentée est tout d'abord le fruit d'un travail de conception mené à l'origine par les personnes ayant participé aux réunions du groupe didactique de l'IREM d'Aix-Marseille dans les années 2007 à 2009 : Nadine Castellani, Guilhem Deulofeu, Karine Bernad, Yves Matheron, Alain Mercier, Karine Millon-Fauré, Christiane Mota, Serge Quilio, Marie-Christine de Redon, Anne-Marie Russac, Nicole Sorrentini.

La proposition initiale a ensuite été complétée, retouchée et améliorée à partir de l'observation et de l'analyse des effets de sa passation dans les classes des collèges Marseilleveyre (Lieu d'Éducation Associé à l'Institut Français de l'Éducation entre 2012 et 2018), Longchamp et Quinet, respectivement par Karine Andreani, Didier Auroy et Farida Méjani. De nombreux professeurs de l'académie nous ont fait part de la passation de cette proposition dans leurs classes, en particulier à l'issue des stages que nous avons animés.

# INTRODUCTION

## Un choix de transposition didactique : les nombres relatifs comme programmes de calcul

Divers contextes sont usuellement utilisés pour amener les élèves vers une première rencontre avec les nombres relatifs. Dans ces lignes, nous ne reprenons pas toute l'analyse qui a pu être faite des obstacles didactiques vers lesquels aboutissent les diverses métaphores traditionnellement en usage : recettes et dépenses, températures, altitudes, avancer et reculer, etc. Nous partageons ces analyses venues de la didactique des mathématiques et reprises pour partie dans certains des documents d'accompagnement des programmes de Collège édités en 2006 et 2007 par la DGESCO. Nous donnons, dans cette introduction, quelques-uns des éléments qui nous font abandonner ce qui semble être devenu une tradition en usage dans les manuels du commerce. Afin de ne pas ajouter à la difficulté de l'enseignement des nombres relatifs celle de la modélisation de situations du monde social<sup>1</sup>, qu'il nous faudra traiter à l'occasion, nous avons choisi de nous placer résolument dans un cadre interne aux mathématiques afin d'amener les élèves vers une première fréquentation des nombres relatifs ; en fait, essentiellement vers la nouveauté représentée par les négatifs comme type de nombres et les conséquences qui en découlent.

## Se placer au-delà de la mesure des grandeurs, dans le seul cadre de l'algèbre comme science des calculs sur les programmes de calcul

Dans l'entrée que nous avons choisie, les relatifs sont vus comme des opérateurs additifs permettant de simplifier les calculs au sein d'un programme plus complexe. Le programme de calcul initial considéré est du type  $P_1$  : « à un nombre on ajoute un deuxième et on soustrait un troisième ». On travaille donc sur des polynômes du type  $P_1(x) = x + a - b$  où  $x$ ,  $a$  et  $b$  sont des entiers naturels ou des décimaux positifs ; c'est-à-dire des nombres avec lesquels les élèves ont l'habitude de faire des calculs. Le relatif est vu comme l'agent qui permet d'obtenir le programme  $P_2$ , simplifié à partir de  $P_1$  tout en lui étant équivalent : « à un nombre on ajoute ou soustrait un deuxième »<sup>2</sup> ; autrement dit le relatif apparaît dans un premier temps comme « le nombre  $\pm c$  », avec  $c$  entier ou décimal positif, que l'on doit ajouter ou soustraire à  $x$  pour obtenir le même résultat qu'avec  $P_1$ . Donc  $P_2(x) = x \pm c$  où  $c = |a - b|$  et donc  $P_2(x) = P_1(x)$  pour tous les  $x$  pour lesquels les polynômes  $P_2(x)$  (et donc  $P_1(x)$ ) sont positifs ou nuls. On omet de signaler que dans  $\mathbf{N}$  et  $\mathbf{D}_+$ , ces programmes ne donnent pas toujours un résultat, c'est-à-dire pour  $P_2(x) = x - c$  lorsque  $0 \leq x < c$ . C'est la raison pour laquelle on remplace le résultat

---

<sup>1</sup> Pour ce qui concerne la modélisation et son enseignement, on pourra se reporter aux articles « Enseigner les fractions en 6<sup>e</sup> à partir de modélisations au sein d'un travail sur les grandeurs », Auroy & Matheron, 2025 et « La modélisation algébrique. Rendre les élèves producteurs de modélisations algébriques au sein du programme du cycle 4 », Auroy, Guérin, Matheron & Noirfalise, 2025, publiés dans les Actes du colloque sur la modélisation 2023, organisé à Poitiers par la Commission inter-IREM de Didactique en mai 2023.

<sup>2</sup> Nous suivons ainsi le cadre proposé par Yves Chevillard dans son séminaire 2004 – 2005 pour les PCL2 de l'IUFM d'Aix-Marseille, pages 457 et suivantes. Dans ce document, la « notion » de programme de calcul qui permet d'engendrer les débuts de l'étude de l'algèbre du Collège, importe celle d'opérateur sur laquelle nous nous appuyons. Les nombres sont aussi des opérateurs c'est-à-dire que les fonctions « opérateur additif » peuvent être dénotées par la notation de l'opérateur seul. Ainsi +3 dénote la fonction « ajouter 3 » que l'on nomme « programme de calcul » parce qu'on ne dispose pas de la notion d'opérateur sur un ensemble de nombres (opérateur étant défini par exemple en association à opérande dans la description d'une opération, +3 est alors *a minima* un « opérateur constant »), ou de la notion de fonction numérique, bien plus élaborée. La désignation *programme de calcul* est donc seulement une forme langagière.

possiblement inexistant par l'indication du programme de calcul, sans faire de démonstration d'existence.  $\pm c$  devient ensuite un opérateur additif (ajouter ou soustraire  $c$ ), puis un nombre.

A l'intérieur des mathématiques, que l'on choisisse d'amener les négatifs par la nécessité de résoudre dans tous les cas l'équation  $a + x = b$  ( $a$  et  $b$  entiers naturels) ou par la commodité qu'ils apportent dans les calculs<sup>3</sup>, se pose toujours, au plan didactique, la question de l'identification à un nombre de ce qui a d'abord été fonctionnellement rencontré, soit comme une classe d'équivalence dans le cas des équations, soit comme un opérateur dans le cas des programmes de calcul, et qui, finalement, aboutit dans ce cas encore, à la notion de classe d'équivalence.

Pour une justification de la validité mathématique de ce choix de transposition didactique – à l'opposé des approches par les températures, les profondeurs, les ascenseurs, etc., abondante dans la littérature des manuels du commerce sur les nombres relatifs –, on pourra se référer avec profit à l'annexe 2 de ce texte. La notion de classe d'équivalence n'est plus enseignée en tant que telle à ce niveau du cursus. Mais elle a été rencontrée de manière implicite, sans un fondement bâti sur l'organisation mathématique à laquelle elle est attachée, au sein du curriculum portant sur les fractions. En effet, les fractions  $\frac{4}{6}, \frac{6}{9}, \dots, \frac{50}{75}, \dots$  appartiennent à la

classe d'équivalence de la fraction  $\frac{2}{3}$ , ce que valide le vocabulaire scolaire en usage, en les qualifiant l'équivalentes ou d'égales. Cependant, une transposition didactique respectueuse de la notion mathématique n'est quasiment jamais offerte aux élèves, notamment par des professeurs qui suivent les propositions des manuels sur les fractions : ignoré des élèves, ce manque peut se constituer en obstacle durable.

Le lever nécessite que l'on ait les moyens de faire éprouver par les élèves ce que l'on gagne à élargir la notion de nombre : deux nombres pour en représenter un seul dans le cas des rationnels positifs et, dans le cas de notre proposition sur les relatifs, une économie de calcul. Les techniques de calcul sont conservées, tandis que la notion évolue et perd des propriétés qui semblaient essentielles car définitoires, tout en s'élargissant vers d'autres ; ce qui est le propre de la modélisation. Par exemple, avec les nombres relatifs, se perd l'identification de l'entier naturel à la mesure d'une grandeur additive : le cardinal d'un ensemble fini en tant que grandeur attachée à une « collection ». Ce pourrait être le cas en primaire où ce vocabulaire n'est évidemment pas utilisé, mais où la notion transposée de nombre comme *mesure de grandeur* dans le cas du cardinal d'un ensemble fini, en bijection avec un sous-ensemble fini de  $\mathbb{N}$ , pourrait y être enseignée.

Du point de vue des élèves, avec les nombres relatifs, le rapport à la notion de nombre évolue ; ce qui nécessite de leur part un engagement dans une dialectique du souvenir et de l'oubli. Ce phénomène d'enseignement qui, en vérité, suit le processus de modélisations successives spécifique de l'épistémologie des mathématiques, provoque chez des élèves un sentiment de déconcertation : on ne reconnaît plus l'univers de ses connaissances antérieures. Une telle déconcertation cognitive, forcément répétée dans l'enseignement, conduit des élèves vers un refus de l'étude des mathématiques. C'est ainsi que le rapport à la multiplication comme addition répétée doit être « oublié » dans le cas de produits d'irrationnels : par exemple pour le calcul de la circonférence d'un cercle de diamètre la diagonale d'un carré.

---

<sup>3</sup> Ils évitent d'avoir à distinguer des cas de figure, comme l'explique Chasles lorsqu'il invente ce que nous appelons les « mesures algébriques ». C'est-à-dire « en donnant aux segments les signes qui leur conviennent » la possibilité d'un calcul algébrique qu'il écrit, sur les points  $a, b$  et  $c$  :  $ab + bc + ca = 0$ .

Nous avons tenté d'atténuer, entre autres de deux manières, la difficulté causée par une rupture avec l'univers de connaissances antérieures. D'une part parce que les nombres relatifs sont vécus comme porteurs d'une ergonomie réalisant une économie à l'usage que les élèves éprouvent. D'autre part, parce que les élèves sont engagés dans un authentique processus collectif de recherche. Ce qui signifie que les erreurs ne sont pas des fautes, mais sont considérées naturelles au cours d'un processus dans lequel chacun apporte sa contribution à la recherche. Les erreurs y sont prises en charge, discutées et corrigées collectivement par des pairs, et non pas uniquement depuis l'autorité du professeur.

### **Une transposition didactique recourant aux métaphores sur les grandeurs repérables non mesurables, source d'obstacles didactiques**

Avec les entiers négatifs, une possible identification au cardinal, qui confère un certain sens aux entiers naturels, disparaît. C'est sans doute la première fois pour des élèves au sein de leur cursus scolaire. Au contraire, dans l'enseignement des fractions au cours moyen, un « sens » attaché à de nouveaux nombres, au-delà des entiers, qui peut être conservé. Pour cela, il faut que les fractions soient identifiées à la mesure de grandeurs, comme la longueur par exemple dans un premier temps, puis à d'autres grandeurs (aire, volume, masse, etc.) ; ce qui n'est malheureusement pas le cas « des activités » de la majorité des manuels du commerce.

Pour les relatifs, certains auteurs des manuels actuels du secondaire pensent résoudre le problème qui surgit en commençant à « donner du sens » aux négatifs à travers la mesure d'autres grandeurs : les températures, les profondeurs, « les étages »... Mais c'est alors repousser l'obstacle à plus tard, au moment où l'on enseignera les opérations sur les relatifs. Ces grandeurs sont en effet des grandeurs que l'on qualifie de « repérables », au contraire des grandeurs « mesurables ». La mesure de ces dernières vérifie la propriété d'additivité : si  $A \cap B = \emptyset$ , alors  $m(A \cup B) = m(A) + m(B)$ . Ce n'est pas le cas des grandeurs repérables. Une conséquence importante en découle : on ne peut pas opérer sur ces grandeurs, c'est-à-dire les ajouter, soustraire, multiplier, etc.

Par exemple, considérant la grandeur « température » dont des mesures en °C et °F peuvent être négatives, il est évidemment possible de comparer deux températures en comparant la hauteur d'une colonne d'alcool dans un thermomètre, et donc de dire si elles sont égales ou si l'une est inférieure à l'autre ; autrement dit de mettre une relation d'ordre sur la grandeur température. Mais la température est une grandeur repérable et non pas une grandeur mesurable : il est impossible d'ajouter les températures, de les soustraire ou les multiplier. On sait en effet que lorsqu'on mélange deux liquides, en tant qu'« objets » pourtant deux à deux disjoints, et même s'ils sont en quantités égales, le mélange, qui est réunion des deux liquides, n'a pas pour température la somme des températures.

Penser que l'on peut ajouter et multiplier-diviser par un entier des mesures de température, parce qu'on le fait pour obtenir « la température moyenne », c'est oublier que dans ce cas, la température moyenne est obtenue, comme son nom l'indique, en tant que paramètre de position (la moyenne) des valeurs d'un caractère d'une série statistique attaché à une grandeur seulement repérable. C'est aussi le cas d'autres grandeurs non pas mesurables, comme la date, le potentiel électrique, l'indice de dureté d'un métal, etc., pour lesquels parler de somme ou de produit n'a pas de sens. La confusion s'accroît lorsqu'on sait que, par ailleurs, la différence des mesures de deux grandeurs seulement repérables est mesurable. Ainsi si la température baisse de 7 °C, puis augmente de 5 °C, alors cela revient à ce qu'elle n'ait baissé que de 2 °C ; ce qu'on peut traduire par  $-7 + 5 = -2$ .

C'est encore le cas lorsqu'on recourt, pour enseigner les nombres relatifs, à la droite graduée, plus précisément, au « repérage sur la droite graduée ». On s'appuie encore sur une grandeur seulement repérable et non pas mesurable, associée à des nombres que l'on nomme abscisses de points. Si l'on souhaite opérer à partir de cette grandeur, après qu'on a défini l'abscisse d'un point sur une droite, il est nécessaire d'en définir, et d'en enseigner, une autre : « le déplacement sur une droite », qui est mesurable. Ce qu'on ne dit pas reste implicite, et est donc parfois mal compris. Soit donc une translation de vecteur de même direction que la droite, de même sens ou de sens contraire au sens du repère et de norme la distance des deux points.

La métaphore qui consiste à utiliser cette « grandeur déplacement » fonctionne à peu près bien auprès d'un nombre significatif d'élèves pour ce qui concerne l'addition ; il s'agit, dans ce cas encore, de travailler sur la différence de deux grandeurs repérables, qui devient mesurable. Mais l'usage de la métaphore se complexifie pour la soustraction et se constitue en obstacle pour la multiplication des relatifs. En effet, la grandeur « déplacement » ainsi construite est une grandeur de dimension 1, mais le produit de deux grandeurs de dimension 1 est une grandeur de dimension 2. Sur quel objet pourrait-on associer une grandeur produit de deux déplacements sur une droite graduée, notamment dans le cas d'un facteur négatif ?<sup>4</sup> Le souvenir de la définition des relatifs à partir de déplacements sur une droite graduée se constitue en obstacle lorsqu'il faut par la suite étudier le produit ou le quotient de deux relatifs.

Des artifices didactiques, que l'on trouve dans certains manuels, ont été proposés pour tenir compte de la dimension 2 affectée à la grandeur-produit. Dans un repère orthonormé du plan, les deuxième et quatrième quadrants seraient associés à des produits de deux facteurs dont l'un est négatif, tandis que le premier et le troisième seraient positifs. Nous ne suivons pas cette voie, ne serait-ce qu'en raison des questions que cette métaphore géométrique soulève et auxquelles les adeptes de cette technique didactique n'apportent pas de réponse. La docilité des élèves à accepter parfois une telle « pseudo-explication » de la règle des signes ne signifie pas qu'ils ne se posent pas de questions à propos des mystères ayant conduit à de tels résultats. Certains finissent par se dire qu'en mathématiques, décidément, il suffit de faire car il n'y a rien à comprendre...

### **Tenir compte des obstacles de nature épistémologique en mathématiques pour minimiser ceux de nature didactique : la dialectique système-modèle**

La dynamique propre à la mathématisation est le plus souvent, et cela est particulièrement vrai pour les nombres relatifs et leurs opérations, le fruit d'une dialectique entre un système et l'un des modèles mathématiques qui le représente ; le système pouvant être lui-même mathématique comme il en va, par exemple, des systèmes de nombres. Par exemple, une matrice (tableau de nombres) peut être considérée comme un vecteur, alors que le premier travail avec la notion de vecteur, à la transition Collège-Lycée, lui conférerait le sens d'agent d'une translation affine ou encore, de façon plus fruste, de flèche à dessiner dans le plan représenté par la feuille... Le système constitué à l'origine par les flèches, ou les agents de translations, a pu être modélisé en espace vectoriel, parce qu'à son tour cette notion permet de modéliser d'autres systèmes (des ensembles de matrices, de polynômes, etc.), qui peuvent donner naissance à de nouveaux modèles ; par exemple à la notion d'espace vectoriel de dimension infinie.

Sur l'exemple des vecteurs, on voit que dans une étape ultérieure, le modèle devient système et qu'un modèle d'ordre supérieur le représente. Au cours du processus de modélisation, le modèle importe certains des traits du système – certains sont « aplatis » et d'autres oubliés, par exemple

---

<sup>4</sup> Des mesures signées ne seront rencontrées pour la première fois que bien plus tard, et par un nombre restreint d'élèves, étudiant peut-être au début du calcul intégral, les aires « sous » l'axe des abscisses...

la représentation d'un vecteur par une flèche –, mais le travail qui se mène ensuite dans le modèle (en tant que simplification du système ou catégorie de systèmes que l'on décide d'apparenter) permet d'obtenir des informations sur le système modélisé ; par exemple, il devient possible d'effectuer des calculs sur les vecteurs, pourtant vus tout d'abord comme objets géométriques ou algébriques (classes d'équivalence de bipoints). Le modèle « espace vectoriel » devient système lui-même, à propos duquel peuvent se poser de nouvelles questions : par exemple, peut-on définir une norme sur un tel espace ? La question entraîne vers l'étude d'autres types d'espaces vectoriels, de Hilbert, de Banach... Le sens qui était attaché au système modélisé peut alors ne plus s'appuyer sur certaines des caractéristiques du système antérieur, créant alors une difficulté épistémologique qui se traduit par une difficulté didactique pour les élèves.

Aussi avons-nous pris le parti de minimiser le risque de créer des obstacles didactiques, tout en sachant que certains, de nature épistémologique et donc propres aux mathématiques, sont inévitables ; c'est particulièrement le cas lorsqu'on se penche sur l'histoire des nombres relatifs (cf. annexe 1). C'est aussi la raison pour laquelle notre proposition ne débute pas par une rencontre avec les relatifs qui s'appuierait pour cela sur leur usage social, et les ferait alors voir par les élèves comme mesures de certaines grandeurs repérables (températures, ascenseurs, etc.) Le concept de « grandeur » n'a été d'ailleurs, et jusqu'à un passé récent, très peu enseigné dans les classes qui ont précédé. Il est donc en grande partie ignoré des élèves autrement que par leur contact avec la réalité sensible, hors de l'école : le temps passe, le poids et la taille s'accroissent, la vitesse des véhicules varie, etc.

Des obstacles de nature épistémologique surgissent inévitablement dans l'étude des relatifs, comme il en va aussi pour d'autres domaines des mathématiques, avons-nous dit. C'est ce qui fait l'une des difficultés de l'apprentissage des mathématiques. Si certaines des organisations mathématiques et didactiques construites permettent de les minimiser, seul l'usage dans lequel sont prises les notions nouvelles permet dans bien des cas de les surmonter. Au sens ancien, que l'on avait des difficultés à saisir, se substitue l'usage qui procure un sens nouveau : lorsqu'on écrit avec une certaine familiarité que  $\ln x^n = n \ln x$ , on oublie temporairement qu'aussi  $\ln x = \int_1^x \frac{dt}{t}$ , voire même que la notion d'homomorphisme autorise cette écriture, et le sens provient du calcul que l'on mène à bien, durant le temps où l'on s'y engage. S'enclenche en effet, au cours de l'activité mathématique, un processus qu'Anna Sfard a appelé de « réification » : autrement dit de transformation en un objet concret de ce qui apparaissait auparavant comme une abstraction difficile à maîtriser. Dans le cas de l'algèbre, qui est précisément le domaine auquel appartiennent les nombres relatifs, appelés autrefois « nombres algébriques », elle indique :

1. « Only when a person becomes capable of conceiving the notion as a fully-fledged object, we shall say that the concept has been reified. Reification, therefore, is defined as an ontological shift – a sudden ability to see something familiar in a totally new light. » (Sfard, 1991) 2. « Seeing a mathematical entity means being capable of referring to it as if it was a real thing – a static structure, existing somewhere in space and time. It also means being able to recognize the idea “at a glance” and to manipulate it as a whole, without going into details. » (Sfard, 1991) ou encore : 3. « [...] without an ability to give some kind of explanation to the formal algebraic procedures, the students are not very likely to be able to cope either with non-standard questions or with more advanced algebraic ideas which will be introduced to at least some of them in the future. » (Sfard, 1994)<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> 1. C'est seulement quand une personne atteint la capacité à concevoir une notion comme un objet à part entière que nous dirons que le concept a été réifié. La réification est donc définie comme un changement ontologique – une

La dernière citation est particulièrement éclairante lorsqu'on la rapporte aux difficultés connues que rencontrent les élèves pour mener à bien des opérations sur les nombres relatifs, alors qu'arrivés en 3<sup>e</sup>, ils les pratiquent déjà depuis plusieurs années. Difficulté qui s'accroît et empêche de donner du sens à certaines expressions algébriques plus complexes pour lesquelles le fait même qu'on puisse s'y intéresser apparaît bien mystérieux : on pense ici à l'expression  $ax^2 + bx + c$  dont l'égalité à 0 apparaît des plus curieuses à un grand nombre de nos contemporains.

### **Le schéma général du PER sur les nombres relatifs**

Revenant au PER sur les relatifs, les opérateurs qui permettront en son début de simplifier les calculs dans les programmes de calcul, semblent se comporter à l'usage, et du point de vue des élèves, comme des nombres. On travaille alors la question : « le sont-ils vraiment ? » Ou encore : « à quoi reconnaît-on qu'une entité mathématique est un nombre ? » La réponse apportée est la suivante : si l'on peut faire, avec ces entités nouvelles, des opérations comme celles que l'on connaît déjà sur les nombres qui nous sont familiers, alors on pourra considérer que ce sont des nombres. C'est un élargissement de la notion de nombre, au-delà de leur fonction première attachée à la mesure. Une nouvelle question surgit : « que faudrait-il, par exemple et pour commencer, pour pouvoir faire des additions avec ces entités ? » La réponse à construire, les techniques à établir (les « règles d'addition », comme on dit), doivent être compatibles avec celles que l'on connaissait sur les positifs puisqu'on a pu identifier un positif à sa valeur absolue. Ce travail de construction donne du sens et ôte le mystère, qui semble impénétrable à certains élèves, relatif aux techniques permettant d'additionner et de soustraire des relatifs. Il en sera de même pour la multiplication.

Si l'on veut que l'ensemble des calculs sur tous les nombres, positifs et négatifs, soient cohérents, c'est-à-dire si l'on veut que les négatifs soient des nombres, existe pour la multiplication la nécessité d'accepter que le produit de deux négatifs soit positif. Quoiqu'il en soit, cette nécessité, manipulée formellement sans problème, heurte le « bon sens » qui cherche à maintenir les sens antérieurs attribués au nombre comme mesure. C'est pire encore quand on explicite « la règle des signes » sans avoir défini une « multiplication des signes », mais en usant de la métaphore des amis et des ennemis ou des quadrants d'un repère orthonormé du plan. La réussite du processus de réification nécessite le passage par la recherche des raisons mathématiques qui conduisent à établir ce que A. Sfard appelle « les procédures formelles algébriques » ; même si ces raisons seront temporairement oubliées au fur et à mesure de l'usage des dites « procédures ».

Les relatifs sont donc des nombres, des entités sans dimension, des scalaires, étudiés à partir d'une question interne aux mathématiques, dont la réponse est contenue dans la fonction qu'ils remplissent : simplifier des calculs dans des programmes de calcul. Ils sont ensuite retrouvés comme objets utiles pour certains usages sociaux (mesurer la température, l'échelle des temps historiques, etc.) Nous n'ignorons pas que les élèves, en tant que personnes plongées dans une société, ont déjà rencontré les relatifs : températures, ascenseurs par exemple. Mais le « jeu »

---

soudaine capacité de voir quelque chose de familier sous un jour totalement nouveau. 2. Voir une entité mathématique comme un objet, c'est être capable de se référer à elle comme si elle était une chose réelle—une structure statique, existant quelque part dans l'espace et le temps. Cela signifie également être capable de reconnaître l'idée « d'un coup d'œil » et de la manipuler comme un tout, sans entrer dans les détails. 3. Sans la capacité à donner quelque explication aux procédures formelles algébriques, les élèves sont peu susceptibles d'être en mesure de faire face soit à des questions non standard, soit à des idées algébriques plus avancées qui seront introduites dans l'avenir, au moins à certains d'entre elles.

mathématique auquel on souhaite les faire jouer – les termes, le plus souvent implicites, qui constituent le contrat didactique – obéit à des règles qui consistent à ne pas recourir à cette (re)connaissance sociale. Ce que les élèves comprennent très bien et à quoi ils se plient lorsque le professeur est amené à le leur rappeler ; chose rencontrée assez rarement dans nos multiples observations de classes enseignées de cette manière sur ce thème depuis 2008.

Dans ce parcours, avant d'arriver à l'identification des relatifs à des nombres, ces entités manipulées prennent divers statuts. Aussi, la transition entre opérateur d'un programme de calcul et nombre relatif doit être accompagnée. Nous la ménageons, au cours du parcours proposé, par l'identification, par exemple, de  $+5$  à  $5$  (car  $0 + 5 = 5$  ; le programme « ajouter 5 », noté  $+5$ , est alors identifié au nombre obtenu  $5$ ), et de  $0 - 4$  à  $-4$  (car la première écriture signifie que l'on soustrait  $4$  à  $0$ , donc que l'on utilise le programme « soustraire  $4$  », noté  $-4$ ). Cette identification est facilitée par l'utilisation « en acte », c'est-à-dire sans évoquer ou avoir même conscience ou connaissance de l'existence de la notion, de la commutativité dans les programmes de calcul, en fait dans les sommes algébriques, qui « favorise » l'arrivée des additions dans des calculs où les relatifs sont écrits avec des parenthèses.

L'identification est encore facilitée pour les élèves par un travail de routinisation, qui est conduit à l'aide d'un nombre important d'exercices d'entraînement : on va donc vers une « réification ». Lorsqu'au cours de cet apprentissage, on a besoin de s'assurer de la justesse du résultat que l'on a obtenu en revenant au sens premier qui leur avait été conféré, on peut toujours vérifier la coïncidence des résultats trouvés sur des nombres avec ceux obtenus en les considérant comme opérateurs dans des programmes de calcul. Ainsi est-il toujours possible pour les élèves de revenir au sens premier lorsqu'ils en éprouvent le besoin tout au long de cet apprentissage que l'on doit considérer sur une longue durée. Ce qui signifie que ce parcours n'est pas à passer d'un bloc, mais qu'il doit se dérouler sur l'année scolaire : l'avancée dans le nouveau s'accompagnant d'occasions de reprises qui permettent à certains des élèves d'apprendre après-coup des notions antérieurement enseignées et étudiées par la classe.

Yves Matheron

## Quelques notions de théorie anthropologique du didactique

La connaissance mathématique produite par les mathématiciens n'est pas celle enseignée à l'école. Elle subit, pour l'adapter à l'enseignement, une série de transformations qu'étudie la théorie de la transposition didactique (Chevallard 1985, 1991). Nous différencierons les savoirs savants produits par les mathématiciens des savoirs à enseigner, désignés comme tels par les représentants du système d'enseignement (mathématiciens, politiques, représentants de la société, professeurs...) qui orchestrent la sélection, la définition, l'organisation des savoirs dans la limite de contextes culturels, sociaux et historiques. La transposition didactique relative à l'organisation mathématique qui est le substrat de ce PER se trouve exposée en annexe 2, à la fin de ce texte. Une fois les savoirs à enseigner définis, il faut encore les distinguer de ceux effectivement enseignés par le professeur et de ceux réellement appris par les élèves. Ainsi le savoir produit initialement subit une double transformation : la transposition didactique externe qui sélectionne et transcrit les savoirs à enseigner à partir du « savoir savant » et une transposition didactique interne à l'intérieur du système d'enseignement. Durant cette seconde étape, c'est le professeur qui, à partir des textes officiels que sont les programmes, va construire les savoirs qu'il est en charge d'enseigner, savoirs qui deviennent des objets d'enseignement. C'est alors à lui d'organiser les conditions de son enseignement, modulées par les contraintes et les nombreux assujettissements auquel il est soumis. Il ne suffit pas d'imposer que tel savoir soit enseigné pour qu'il le soit effectivement. De plus les savoirs diffèrent selon l'institution dans laquelle on les étudie. C'est pourquoi il s'avère utile d'interroger l'organisation des savoirs mathématiques à enseigner.

Le savoir mathématique est lui-même subdivisé en domaines, secteurs, thèmes et sujets. Enseigner un savoir mathématique suppose la mise en place d'une organisation mathématique de ce savoir en dégageant un ensemble de types de tâches, noté  $T$ , associées à une ou des techniques  $\tau$  pour accomplir ce type de tâches  $T$ , techniques  $\tau$  justifiées par une technologie  $\theta$ , c'est-à-dire un discours sur la technique. Cette technologie  $\theta$  est elle-même justifiable par une théorie  $\Theta$ . Le couple  $[T/\tau]$  fait référence à un savoir-faire qui nécessite le bloc  $[\theta/\Theta]$  ; ce dernier en constitue l'environnement technologico-théorique. Un tel modèle nous montre la dualité de l'organisation autour d'un savoir-faire et d'un savoir, savoir qui apparaît comme un discours qui produit, justifie et rend compréhensibles des techniques, qui peuvent être plurielles, pour un même type de tâches. Le choix des techniques diffère selon le système d'enseignement, mais aussi selon la personne qui les met en œuvre ou encore selon l'institution dans laquelle cette organisation mathématique existe. Une organisation mathématique la plus petite, construite autour d'un seul type de tâches  $T$ , et qu'on qualifie alors de ponctuelle, peut donc se noter à l'aide des deux couples  $[T/\tau]$  et  $[\theta/\Theta]$ , ou encore plus simplement  $[T/\tau/\theta/\Theta]$ . Les organisations mathématiques ponctuelles s'agrègent et s'amalgament pour donner des organisations mathématiques d'ordre supérieur relevant de thèmes (un chapitre autour d'un théorème, l'addition des relatifs par exemple), de secteurs (les nombres relatifs, plusieurs théorèmes par exemple), un domaine (l'algèbre en poursuivant sur cet exemple).

Ce modèle peut paraître abstrait au premier abord, mais il est fort utile car il permet d'analyser ce qui est enseigné ou ce qui doit l'être. Pour rendre compte de la manière dont les savoirs sont enseignés, la Théorie Anthropologique du Didactique (TAD) dans lequel ce modèle prend place, développe un autre concept théorique : celui d'organisation didactique. Yves Chevallard (1998) propose une modélisation du processus didactique et distingue « six moments de

l'étude » ou « moments didactiques », sans que l'expression « moment » n'impose une représentation temporelle séquentielle. Il s'agit plutôt de « passage obligé », quel que soit le déroulement de l'étude suivi.

Le premier moment est celui de la première rencontre avec l'organisation mathématique mise en place. Cette première rencontre peut suivre des formes diverses, mais elle nécessite toujours de rencontrer au moins un type de tâches  $T$  dont la problématique permet la dévolution de la question étudiée aux élèves ; la responsabilité de l'identifier et de commencer à y apporter réponse leur incombe. En effet, il est indispensable que les élèves s'emparent du problème posé qui doit leur apparaître suffisamment problématique et qu'ils s'engagent alors dans la recherche de techniques pour y répondre.

Le second moment est celui de l'exploration du type de tâches  $T$  et de l'élaboration d'une technique  $\tau$  relative à ce type de tâches. En effet, toute activité mathématique nécessite de fabriquer une technique particulière pour répondre à un problème spécifique. La technique ainsi mise en place deviendra ensuite l'outil de résolution routinier qui permettra de résoudre toute une classe de problèmes du même type.

La technique  $\tau$  élaborée est alors justifiée pendant le troisième moment qui voit la constitution de l'environnement technologico-théorique  $[\theta/\Theta]$ . C'est un moment qui peut interagir avec les autres : la première rencontre peut être l'écho d'un environnement technologico-théorique ancien que le moment d'exploration viendra conforter ou, au contraire, perturber pour le faire évoluer.

Il faut alors travailler la technique pour en tester l'efficacité et la fiabilité. C'est le moment de travail de la technique pendant lequel les élèves en acquièrent la maîtrise, ce qui nécessite une certaine quantité de spécimens du ou des types de tâches à l'étude. Ce moment permet aussi de revenir, d'améliorer et de maîtriser l'organisation mathématique qui a été construite.

Signifier explicitement le savoir mathématique qui vient d'être élaboré collectivement et l'ancrer dans un ensemble de connaissances communes est la fonction que revêt le moment de l'institutionnalisation. Il permet aussi de ne conserver en mémoire que l'indispensable de l'organisation mathématique. Certaines des tentatives, certaines des techniques peu performantes, qui avaient émergé lors de l'élaboration de l'organisation mathématique, ne sont pas retenues.

Le dernier moment est celui de l'évaluation, intrinsèquement lié au moment de l'institutionnalisation. En effet, Yves Chevillard (1998) précise qu'« en pratique, il arrive un moment où l'on se doit de “ faire le point ” : car ce moment de réflexivité où, quels que soient le critère et le juge, on examine ce que vaut ce qui a été appris » ou, plus exactement : « Que vaut, en fait, l'organisation mathématique qui s'est construite et institutionnalisée ? Au-delà de l'interrogation sur la maîtrise, par telle personne, de telle technique on trouve alors l'interrogation sur la technique elle-même – est-elle puissante, maniable, sûre, robuste aussi ? »

Le Parcours d'Etude et de Recherche (PER) qui suit est bâti à l'aide des outils que constituent les deux notions d'organisations mathématique et didactique dont nous venons d'exposer très brièvement les grandes lignes.

Farida Méjani

# LE PARCOURS D'ETUDE ET DE RECHERCHE

## Préalable

Avant de lancer les élèves dans ce parcours, il est nécessaire qu'ils aient tout d'abord travaillé la définition de la différence (dans  $\mathbf{N}$  ou dans  $\mathbf{D}_+$ ). La notion de différence, qui a été étudiée à l'école primaire et qui fait partie des capacités du programme de 6<sup>e</sup> (« Connaître la signification du vocabulaire associé : somme, différence, produit, *terme*, *facteur*, *dividende*, *diviseur*, *quotient*, *reste* », est-il écrit dans le programme de 6<sup>e</sup> en vigueur jusqu'à la rentrée 2015), doit être une connaissance disponible, élément non problématique, faisant partie du « milieu » comme ensemble des connaissances stabilisées. Il est notamment nécessaire de savoir que la différence des nombres  $a$  et  $b$  est le nombre  $d$  tel que  $a + d = b$  et qu'on note  $d = b - a$

## Première séquence

### Élaboration d'une technique pour calculer mentalement $a + b - c$

**Durée : l'enseignement commence par des calculs courts, de 5 à 10 min maximum en début de séance ; mis bout à bout et lorsque l'enseignement se passe ensuite en continu, il faut compter environ 5 séances de 55 min pour l'ensemble de cette séquence**

Le début de l'enseignement proposé dans les pages qui suivent s'appuie sur des moments de calcul mental. L'approche choisie est progressive, afin que les élèves s'habituent à une technique de calcul qui les rend plus simples et qui va conduire tout d'abord à utiliser de nouveaux nombres, puis à les étudier. Aussi, est-il nécessaire que *ces temps de calcul mental* qui inaugurent cette première phase soient *à la fois courts, de l'ordre de 10 min en début d'heure* par exemple, et *étalés dans le temps* : à la suite de ce temps court de calcul mental, on passe à l'étude d'une autre partie du programme de mathématiques de 5<sup>e</sup>, menée simultanément.

#### Étape 1 : cas $b > c$

*Cette étape a pour fonction d'organiser une (nouvelle ?) première rencontre avec le type de tâches T : « exécuter le programme de calcul  $a + b - c$  ( $a$ ,  $b$  et  $c$  entiers naturels) » afin de mettre en échec la technique consistant à réaliser les calculs de gauche à droite en posant les opérations. Il faut donc « inventer » une nouvelle technique ; c'est le moment le plus important du déroulement de cette phase. L'ayant trouvé, il reste encore à s'assurer de sa validité. Un moment technologique, garantissant partiellement la justification du recours à cette technique, conclut cette phase. On institutionnalise ensuite la technique trouvée.*

On engage les élèves dans des calculs du type de ceux qu'ils ont l'habitude de faire : « à un nombre on ajoute un deuxième et on soustrait un troisième ». Mais on cherche à ce que, chez les élèves, apparaisse rapidement la nécessité d'organiser commodément les calculs afin de les rendre plus simples. Il s'agit tout d'abord, pour la consigne 1, de travailler en acte mais bien sûr sans l'explicitier, l'égalité  $(a + b) - c = a + (b - c)$  avec  $a$ ,  $b$  et  $c$  entiers naturels, dans le cas où  $b > c$ . Le professeur annonce qu'on s'intéresse au programme de calcul suivant : « à un nombre on ajoute un deuxième et on soustrait un troisième » que l'on va exécuter mentalement sur des cas particuliers. Il écrit au tableau.

Pour conserver la maîtrise du temps imparti pour chaque calcul, ceux-ci doivent être écrits au tableau au fur et à mesure, ou encore photocopiés ou projetés, les élèves recopiant sur leur feuille le calcul et inscrivant à la suite leur réponse.

**Remarque issue des observations de classes** : le professeur a tout intérêt à dire et à demander que l'on dise « ajouter... puis soustraire... c'est comme ajouter (ou soustraire)... », puis à faire passer de l'écriture en français à l'écriture en nombres. Apparemment, certains élèves rencontrent des difficultés *pour rédiger des phrases*, ce travail peut donc se poursuivre en travail à la maison... La rédaction des phrases et leur verbalisation visent à faire éprouver par les élèves l'économie substantielle que réalisera l'écriture en nombres relatifs.

Le professeur fixe lui-même le temps pour la recherche du premier calcul et demande oralement le résultat avant d'engager la classe dans le calcul du second. Si la technique consistant à calculer d'abord  $b - c$  n'apparaît pas dans le calcul de  $17 + 21 - 1$ , elle a de fortes chances de devenir nécessaire dans le calcul suivant :  $148 + 199 - 99$ . On l'éprouve ensuite sur les autres

calculs, le professeur déterminant le temps de la recherche de chaque calcul. Ce temps doit être bref car cette brièveté force à rechercher les stratégies de calcul les plus efficaces.

L'ensemble des consignes a été regroupé dans le cadre qui suit, afin que le professeur dispose d'une vision globale. Comme indiqué page précédente, ces diverses consignes doivent être données aux élèves *de façon étalée*, doivent occuper *un temps court en début d'heure et pendant plusieurs séances*. On peut évidemment fabriquer d'autres types de calcul, l'essentiel étant que la philosophie propre à chaque étape soit conservée. On peut aussi, selon l'aisance plus ou moins grande des élèves, utiliser des *décimaux non entiers* ; ce qui permet de faire apparaître davantage l'économie de calcul procurée.

Consigne 1 :

Effectue mentalement les calculs suivants :

$$17 + 21 - 1 ;$$

$$148 + 199 - 99 ;$$

$$17 + 35 - 15 ;$$

$$131 + 256 - 56 ;$$

$$39 + 58 - 8 ;$$

$$185 + 2017 - 17.$$

Consigne 2 :

Effectue mentalement les calculs suivants :

$$14 + 17 - 15 ;$$

$$114 + 17 - 15 ;$$

$$1802 + 319 - 315 ;$$

$$4374 + 62 - 61 ;$$

$$4374 + 61 - 62 ;$$

$$7081 + 61 - 62.$$

Consigne 3 :

Effectue mentalement les calculs suivants :

$$458 + 45 - 46 ;$$

$$3469 + 45 - 46 ;$$

$$3469 + 124 - 125 ;$$

$$15627 + 124 - 125 ;$$

$$15627 + 313 - 314 ;$$

$$823 + 313 - 314 ;$$

$$823 + 32 - 33 ;$$

$$4586 + 32 - 33 ;$$

$$4586 + 7538 - 7539.$$

Consigne 4 :

Effectue mentalement les calculs suivants, puis écris sous forme simplifiée à quoi équivaut, dans ces calculs, l'application au premier nombre de l'addition suivie de la soustraction :

$$15627 + 314 - 316 ;$$

$$823 + 34 - 37 ;$$

$$4586 + 34 - 38 ;$$

$$126 + 12 - 15 ;$$

$$3645 + 5241 - 5246 ;$$

$$1010 + 21 - 31 ;$$

$$236 + 22 - 29.$$

Feuille dont dispose le professeur

Les élèves recherchent **individuellement** et **mentalement** les calculs de la consigne 1 et notent au crayon leurs résultats en face de chacun des calculs proposés. Le calcul se faisant mentalement, les élèves **ne sont pas autorisés** à poser les opérations ; ils doivent seulement noter au crayon le résultat qu'ils trouvent pour chacun des calculs. Si les élèves peinent, le professeur peut indiquer qu'ils ont intérêt à rechercher « un truc » permettant de faire les calculs très facilement. En principe, au moins un élève devrait trouver « ce truc » et le communiquer rapidement à la classe, sinon le professeur attire l'attention sur les deux derniers nombres.

Consigne 1 :

Effectue mentalement les calculs suivants :

$$17 + 21 - 1 ;$$

$$148 + 199 - 99 ;$$

$$17 + 35 - 15 ;$$

$$131 + 256 - 56 ;$$

$$39 + 58 - 8 ;$$

$$185 + 2017 - 17.$$

Les calculs ayant été menés à bien, le professeur ou un élève peuvent faire remarquer que l'on n'a pas suivi l'ordre qui paraît canonique d'exécution des calculs, de la gauche vers la droite. En fait, des manuels de primaire proposent des techniques de calcul en ligne avec des arbres de calcul : il est possible que cette disposition réapparaisse alors.

Le professeur demande : ***faisant de la sorte, est-on sûr d'avoir obtenu les résultats exacts ?*** On se contente de vérifier l'exactitude des résultats, par exemple avec **une calculatrice**. On est donc certain que les calculs sont justes et que la technique utilisée est pourvue d'une certaine validité.

*La passation effective de ce travail a montré que ce dispositif, recourant à la calculatrice pour vérifier, peut être proposé puis être abandonné très vite, dans le cas où les élèves ne rencontrent aucune difficulté et sont certains que leurs calculs sont exacts.*

Étant certains que la technique trouvée est valide, cette phase se termine par **une institutionnalisation de cette nouvelle technique**. Pour cela, on peut demander aux élèves de la donner publiquement et oralement en la déclinant, pour chacun des calculs, sur le modèle suivant correspondant au premier calcul : « ajouter 21 et soustraire 1 à un nombre revient à ajouter 20 à ce nombre », etc.

Ces résultats sont notés dans le cahier de cours.

*La partie qui suit et qui porte sur l'écriture des phrases du type « ajouter... et soustraire... à un nombre revient à ajouter... à ce nombre » est longue à faire écrire par les élèves. On peut donc la raccourcir ; soit en limitant le nombre de phrases, soit en utilisant des exemples numériques écrits, soit en donnant une feuille à coller.*

*Dans ce dernier cas, il est indispensable de ne pas tomber dans un travail du type des « exercices du Bled ». Quel que soit le choix fait, mais en tout cas si on suit l'idée d'une photocopie, il est nécessaire de s'assurer que l'institutionnalisation est assumée par la classe, donc est menée de manière collective, à partir des propos des élèves sollicités pour retenir l'essentiel de l'activité et sous la direction du professeur.*

Ce qui est consigné sur le cahier des élèves peut prendre la forme suivante à titre d'exemple, mais ce qui est essentiel est le fait que **ce qui est institutionnalisé soit la trace de l'activité qui a effectivement été menée par la classe** :

## Programmes de calcul « somme et différence »

### I. Rendre plus simple des calculs pour calculer mentalement

#### 1. Consigne 1.

On fait coller la feuille « consigne 1 » sur le cahier et on fait dégager la régularité que l'on note par écrit :

Ajouter 21 et soustraire 1 à un nombre revient à ajouter 20 à ce nombre

Ajouter 199 et soustraire 99 à un nombre revient à ajouter 100 à ce nombre

Ajouter 35 et soustraire 15 à un nombre revient à ajouter 20 à ce nombre

Ajouter 156 et soustraire 56 à un nombre revient à ajouter 100 à ce nombre

Ajouter 58 et soustraire 8 à un nombre revient à ajouter 50 à ce nombre

Ajouter 2017 et soustraire 17 à un nombre revient à ajouter 2000 à ce nombre

#### *On a simplifié des programmes de calculs pour calculer mentalement*

On peut prévoir ensuite des exercices à la maison sur le même modèle, en demandant l'écriture de phrases en français du même type que celles écrites dans le cahier de cours, par exemple avec des exercices comme :

$15 + 37 - 7$  ;  $121 + 229 - 29$  ;  $58 + 1024 - 24$  ;  $104 + 72 - 12$ .

#### Etape 2 : $b > c$ ou $b < c$

*A travers les quatre premiers calculs, il s'agit de continuer à se familiariser avec la technique qui vient d'être mise au point ; ce qui conduit à être attentif au calcul de la différence  $b - c$ . Mais l'utilisation de cette technique est bloquée lors du cinquième calcul pour lequel on n'a plus  $b > c$  ; ce qui rend la soustraction impossible à effectuer dans  $\mathbb{N}$ . Les élèves sont contraints de devoir imaginer une nouvelle technique pour ce type de tâches qui était en passe de devenir routinier, mais s'avère problématique dans certains cas. Il est donc nécessaire d'ébaucher une nouvelle technique et de trouver des moyens de la justifier et la valider.*

Les élèves recherchent *individuellement* et *mentalement* les calculs de la consigne 2 et notent au crayon leurs résultats en face de chacun des calculs proposés.

#### Consigne 2 :

Effectue mentalement les calculs suivants :

$14 + 17 - 15$  ;

$114 + 17 - 15$  ;

$1802 + 319 - 315$  ;

$4374 + 62 - 61$  ;

$4374 + 61 - 62$  ;

$7081 + 61 - 62$ .

Pour chacun des quatre premiers calculs, le professeur fixe la durée de la recherche individuelle et continue de même pour le 5<sup>e</sup> calcul. Il est possible que, dans le 5<sup>e</sup> calcul, des élèves continuent d'ajouter 1 sans avoir remarqué la nouveauté. On peut les convaincre de la fausseté de leur démarche en comparant le 4<sup>e</sup> et le 5<sup>e</sup> calcul. Au même nombre, 4374, si on ajoute 62 puis que l'on soustrait 61, il est vraisemblable que l'on n'obtiendra pas le même résultat que si on lui

avait ajouté 1 de moins et soustrait 1 de plus. Rapidement, d'autres s'aperçoivent de l'impossibilité de l'application de la technique précédente.

Néanmoins, les nombres sont les mêmes que dans le calcul précédent, même si les places des deux derniers ont été échangées. Cette remarque, vue par des élèves ou indiquée par le professeur si ce n'est pas le cas, devrait attirer l'attention sur une comparaison possible entre le quatrième et le cinquième programme de calcul.



Dans le quatrième programme de calcul, « ajouter 62 puis soustraire 61 » équivaut à « ajouter 1 », la question cruciale est alors : **à quoi équivaut le programme de calcul « ajouter 61 puis soustraire 62 » ?**

Des élèves devraient fournir la seule réponse possible **dans le cadre « d'une logique des programmes de calcul »** en disant : « à soustraire 1 »... Tout en le justifiant par : « car on soustrait 1 de plus que ce qu'on ajoute ! » Les élèves, éventuellement guidés par le professeur, peuvent expliquer que « enlever 62, c'est enlever 61 et enlever encore 1 » car décomposer une soustraction en une succession de petites différences est une méthode souvent utilisée en calcul mental.

Ces explications constituent des justifications (fonction technologique) qui suscitent l'approbation de la classe et doivent être reçues comme telles par le professeur. Dans le cadre d'un **calcul mental** et d'un **échange oral**, il n'est en effet guère possible d'en attendre davantage. De nouveau, le recours rapide à la calculatrice, si la classe en éprouve la nécessité, permet de valider le calcul. Le dernier cas ne devrait alors pas poser de problème.

### Passage important

*Le professeur peut alors indiquer qu'une justification plus mathématique est possible. Les élèves recherchent et assez rapidement, même s'ils le formulent à leur manière, proposent une technique d'emprunt ou de décomposition judicieuse du premier des nombres. Ce sont des techniques numériques que les élèves ont travaillées en primaire, et qui relèvent de la décomposition additive des nombres. Ces savoir-faire sont enseignés et compris dès le CP, comme l'attestent les écrits suivants, notés par la maîtresse de CP sous la dictée des élèves, et qui leur permettent de prouver que  $10 > 9$  et que  $14 - 5 = 9$  :*



*Une telle technique est encore utilisée dans l'algorithme de la soustraction, lorsque le chiffre du rang à soustraire est supérieur au chiffre du même rang auquel on le soustrait. Ainsi, par exemple, dans la soustraction  $52 - 38$ . Comme  $8 > 2$ , on « emprunte » une dizaine venue de 5 que l'on ajoute à 2 pour obtenir 12, ce qui rend possible la soustraction  $2 - 8$  devenue  $12 - 8$ . Cette technique, parce qu'on commence par « casser » le chiffre de rang supérieur (5 dans ce*

cas) pour rajouter 10 au chiffre du rang immédiatement inférieur, évite le recours à la retenue dont on oublie souvent de tenir compte dans la suite du calcul. La soustraction s'écrit alors :

$$\begin{array}{r} 542 \\ - 38 \\ \hline = 14 \end{array}$$

Cette technique est souvent appelée « méthode anglo-saxonne » ou aussi « méthode par emprunt ». Elle repose sur la transformation suivante :

$$\begin{aligned} 52 - 38 &= 5 \times 10 + 2 - (3 \times 10 + 8) = 4 \times 10 + 10 + 2 - (3 \times 10 + 8) \\ &= 4 \times 10 - 3 \times 10 + 12 - 8 \end{aligned}$$

Tandis que la soustraction « avec retenue » repose sur :

$$\begin{aligned} 52 - 38 &= 5 \times 10 + 2 - (3 \times 10 + 8) = 5 \times 10 + 2 + 10 - (3 \times 10 + 10 + 8) \\ &= 5 \times 10 - 4 \times 10 + 12 - 8 \end{aligned}$$

Les justifications de ces deux techniques sont enseignées avec un vocabulaire adapté dès le CE1 et certains élèves s'en souviennent.

Lorsque les élèves sont confrontés à la nécessité de justifier la soustraction de 1 à 4374 dans le calcul  $4374 + 61 - 62$ , il en est toujours quelques-uns pour se souvenir de la technique d'emprunt et l'adapter à la situation nouvelle.

Ainsi :  $4374 + 61 - 62 = 4373 + 1 + 61 - 62 = 4373 + (61 + 1) - 62 = 4373 + 62 - 62 = 4373$ .  
Et on a prouvé et trouvé la raison pour laquelle :  $4374 + 61 - 62 = 4374 - 1$ .

La comparaison des premier et dernier termes de cette suite d'égalités, 4374 et 4373, indique clairement que l'on a soustrait 1 à 4374. Une telle justification peut servir d'aide et de vérification aux élèves débutant dans ces calculs. Par exemple, si on ne sait pas comment faire pour  $8456 + 671 - 677$ , on dit qu'on « emprunte » à 8456 ce qu'il manque pour « transformer 671 en 677 », soit 6 ; et cela revient à lui retrancher 6. Ce qui s'écrit :

$$8450 + 6 + 671 - 677 = 8450 + (6 + 671) - 677 = 8450 + 677 - 677 = 8450 = 8456 - 1.$$

Une institutionnalisation est de nouveau à conduire, au cours de laquelle le **professeur en interaction avec la classe**, fait dégager l'essentiel. Elle débouche de nouveau, par exemple après collage de la feuille si cette option a été choisie, sur un écrit consigné dans le cahier de cours, du type :

## 2. Consigne 2

Ajouter 17 et soustraire 15 à un nombre revient à ajouter 2 à ce nombre  
Ajouter 319 et soustraire 315 à un nombre revient à ajouter 4 à ce nombre  
Ajouter 62 et soustraire 61 à un nombre revient à ajouter 1 à ce nombre

Mais attention !

**Ajouter 61 et soustraire 62 à un nombre revient à soustraire 1 à ce nombre**

En effet, c'est ce que montre l'exemple suivant :

$$\begin{aligned} 4374 + 61 - 62 &= 4373 + 1 + 61 - 62 \\ &= 4373 + (61 + 1) - 62 \\ &= 4373 + 62 - 62 \\ &= 4373. \end{aligned}$$

Donc :  $4374 + 61 - 62 = 4374 - 1$ .

***Simplifier un programme de calcul revient parfois à soustraire***

**Etape 3 : dans tous les cas  $c > b$**

*Il s'agit maintenant d'éprouver la validité de la technique sur quelques tâches du même type afin de se convaincre de son efficacité, et d'institutionnaliser ce que l'on peut retirer de cette expérience.*

On propose encore aux élèves de travailler **individuellement** et **mentalement** afin de donner rapidement les résultats des calculs de la consigne 3. Les élèves notent au crayon leurs résultats en face de chacun des calculs proposés.

Consigne 3 :

Effectue mentalement les calculs suivants :

$$458 + 45 - 46 ;$$

$$3469 + 124 - 125 ;$$

$$15627 + 313 - 314 ;$$

$$823 + 32 - 33 ;$$

$$4586 + 7538 - 7539.$$

$$3469 + 45 - 46 ;$$

$$15627 + 124 - 125 ;$$

$$823 + 313 - 314 ;$$

$$4586 + 32 - 33 ;$$

$$3,5 + 32 - 31 ; \quad 823 + 7,2 - 8,2.$$

Le professeur pose alors la question : ***Qu'avons-nous appris de ces calculs ?***

Les réponses vont certainement être imprécises, ou confuses, car il n'est pas facile d'exprimer sous la forme d'une seule phrase ce que l'on vient d'observer sur divers spécimens du même programme de calcul  $a + b - c$ , pour lesquels le choix des variables est toujours  $c = b + 1$ . Il faut donc s'attendre à ce que les élèves répondent par des phrases du type : « C'est toujours le nombre de départ moins 1 », « Ça revient à enlever (ou soustraire) 1 », etc.

La question qui vient alors est évidemment : ***En raison (ou à cause) de quelles opérations est-on amené à soustraire 1 (puisque ce n'était pas ce qui se produisait dans les calculs des étapes 1 et 2) ?***

Il est encore vraisemblable, pour les mêmes raisons, que les réponses soient imprécises ou maladroitement, du type « parce qu'il y a un de plus (ou de moins) », etc., mais elles manifestent que l'attention des élèves est désormais attirée par ***ce qui se fait*** avec  $+ b - c$ .

C'est alors au professeur d'indiquer que, pour noter qu'appliquer au premier nombre le résultat de la suite du programme de calcul revient à lui soustraire 1, on va utiliser une notation particulière. C'est donc lui qui enseigne et fixe la notation. ***La place des élèves*** est réservée à la ***justification de la notation*** qui provient d'une simplification raisonnée du programme de calcul.

Ceci est noté dans le cahier de cours après avoir de nouveau collé la feuille de la consigne 3.

### 3. Une nouvelle notation pour simplifier l'écriture

Pour simplifier l'écriture du programme de calcul, « à un nombre, on ajoute 45 et on soustrait 46 », on aurait pu écrire : ... + 45 - 46 = ...-1.

On a préféré écrire :

$$+45 - 46 = -1$$

qui signifie que si à un nombre, on ajoute 45 puis on soustrait 46, alors on lui soustrait 1.

$$\text{Ainsi : } 458 + 45 - 46 = 458 - 1 = 457$$

*P engage les élèves à écrire par eux-mêmes, dans la suite du cours, ce que l'on a alors observé avec les autres programmes de calcul :*

$$+124 - 125 = -1, \text{ ainsi } 15627 + 124 - 125 = 15627 - 1 = 15626$$

$$+313 - 314 = -1, \text{ ainsi } 823 + 313 - 314 = 823 - 1 = 822$$

$$+32 - 33 = -1, \text{ ainsi } 4586 + 32 - 33 = 4586 - 1 = 4585$$

$$+7538 - 7539 = -1, \text{ ainsi } 4586 + 7538 - 7539 = 4586 - 1 = 4587$$

#### Etape 4 : travail de la technique

##### Exercice :

Trouver d'autres écritures qui donnent -1 ?

*Lorsque cet exercice a été travaillé, les élèves utilisent assez vite des décimaux non entiers.*

## Deuxième séquence

### Définition des nombres relatifs, le problème de leur addition

**Durée : entre 3, 4 et 5 séances de 55 min selon les classes et les professeurs**

#### Etape 1 : mise en évidence de nombres négatifs

Deux voies sont possibles pour mener à bien cette étape qui doit se conclure par la mise en évidence d'autres nombres négatifs. Rappelons qu'à la fin de la première séquence, on ne connaît d'eux que  $-1$ .

1. La première voie, sans doute **la plus formatrice**, consiste à demander aux élèves s'ils peuvent trouver des programmes de calculs qui reviendraient à soustraire 2, 3, 4, 5 ou 6 au premier nombre, donc des écritures qui équivalent à écrire  $-2$ ,  $-3$ ,  $-4$ ,  $-5$  ou  $-6$ . Les élèves comprennent qu'il suffit de choisir deux nombres dont la différence est 2, 3, 4, 5 ou 6 et d'écrire correctement qu'on ajoute le plus petit et que l'on retranche ensuite le plus grand. On sélectionne alors diverses propositions qui sont consignées dans le cours afin d'aboutir à des écritures du type :

$$\begin{aligned}+34 - 37 &= -3 \\+34 - 38 &= -4 \\+12 - 15 &= -3 \\+5241 - 5246 &= -5 \\+21 - 31 &= -10 \\+22 - 29 &= -7\end{aligned}$$

Certains élèves ont, à ce stade, toujours besoin du point d'appui qui consiste à dire ou à écrire « ajouter 34 à un nombre puis retranche 37 revient à soustraire 3 à ce nombre », ou encore à écrire : ... + 34 - 37 = ... -3. On les laisse se servir de ce point d'appui que l'on continuera à solliciter ultérieurement, dès qu'on en aura besoin.

2. La seconde consiste à fournir directement aux élèves une liste de calculs **en travail à la maison**. Cette liste est évidemment utilisée après que l'on a emprunté en classe la voie 1.

Consigne 4 :

Effectue mentalement les calculs suivants, puis écris sous forme simplifiée à quoi équivaut l'application au premier nombre de l'addition suivie de la soustraction, dans ces calculs :

$$\begin{array}{ll}15627 + 314 - 316 ; & 823 + 31 - 34 ; \\4586 + 44 - 48 ; & 26 + 52 - 55 ; \\364,5 + 524,1 - 524,6 ; & 1010 + 0,21 - 0,31 ; \\23,6 + 2,2 - 2,9.\end{array}$$

Exemple :

$$\begin{aligned}1350 + 242 - 247 &= 1345 \text{ provient de la simplification du programme de calcul :} \\+242 - 247 &= -5\end{aligned}$$

Les nombres choisis poussent les élèves à utiliser la technique la plus économique, car ils sont assez grands pour rendre délicat le calcul mental de l'addition ; mais les deux derniers nombres sont suffisamment proches pour rendre la différence évidente. Arrivés à ce stade, on a déjà

institutionnalisé, lors de l'étape précédente, le fait qu'un programme de calcul puisse être écrit, de manière beaucoup plus économique, par une soustraction, au premier nombre du programme, d'un nombre  $c$  ; soustraction que l'on a notée  $-c$ . Ceci justifie que l'on engage les élèves dans la deuxième partie de la question.

On aboutit encore, dans ce cas, à faire consigner par les élèves, dans le cahier de cours et à la suite de ce qui précédait, les mêmes résultats :

$+34 - 37 = -3$
$+34 - 38 = -4$
$+12 - 15 = -3$
$+5241 - 5246 = -5$
$+21 - 31 = -10$
$+22 - 29 = -7$

## Etape 2 : travail de la technique

**Exercices** (on peut en inventer d'autres du type  $+a - b$ , avec  $a$  et  $b$  entiers ou décimaux positifs)

Pour chaque programme de calcul ci-dessous, donner le programme de calcul équivalent le plus simple :

$$+4 - 5 ; +3,7 - 4,7 ; +6,34 - 9,34 ; +503,9 - 510,9 ; +54 - 70 ; +768,3 - 769,5 ;$$
$$+72,165 - 74,166 ; +0,8 - 0,9 ; +1,7 - 1,79 ; +2,85 - 22,85.$$

## Etape 3 : où l'on s'intéresse aux opérateurs « addition »

On vient de trouver et de travailler avec des écritures simplifiées de programmes de calcul équivalents, mais les opérateurs additifs ne sont pas encore identifiés à des nombres. Au cours de cette étape, on se dirige vers cette identification ; notamment en éprouvant la commutativité sur ces programmes de calcul (propriété spécifique de certaines opérations que les élèves connaissent), ce qui rapproche le travail mené sur les programmes de calcul de ce qui se fait avec des nombres.

Arrivé en ce point, une question devrait surgir assez naturellement, soit de la part des élèves, soit portée par le professeur mais d'une manière qui paraîtra aller de soi aux élèves car elle affleure du travail antérieurement fait. C'est la suivante : ***On a vu qu'on pouvait écrire de manière simplifiée un programme de calcul qui aboutit à soustraire, peut-on faire de même pour ajouter ?***

Les élèves répondent généralement « oui » car ils ont déjà rencontré, à défaut d'avoir écrit des positifs avec un signe  $+$ , des programmes de calcul équivalents à ajouter un nombre à un autre. Cela a été le cas, par exemple, dans des calculs des étapes 1 et 2 de la première séquence où les calculs étaient les suivants :

$$17 + 21 - 1 ; 148 + 199 - 99 ; 17 + 35 - 15 ; 131 + 256 - 56 ; 39 + 58 - 8 ; 185 + 2017 - 17 ;$$
$$14 + 17 - 15 ; 114 + 17 - 15 ; 1802 + 319 - 315 ; 4374 + 62 - 61.$$

et que l'on reprend désormais en s'intéressant au programme  $+b - c$  ; ce que le professeur peut montrer pour le premier de la liste :  $+21 - 1 = +20$  (ajouter 21 puis soustraire 1 équivaut à ajouter 21). Les élèves sont engagés à continuer. On note alors les résultats obtenus dans des

programmes de calculs plus amples, pour lesquels *on décide, par commodité, de ne pas écrire le premier nombre* :

$$\begin{aligned}+ 21 - 1 &= + 20 \\+ 199 - 99 &= + 100 \\+ 35 - 15 &= + 20 \\+ 256 - 56 &= + 200 \\+ 58 - 8 &= + 50 \\+ 2017 - 17 &= + 2000 \\+ 17 - 15 &= + 2 \\+ 319 - 315 &= + 4 \\+ 62 - 61 &= + 1\end{aligned}$$

On institutionnalise de nouveau ce qui vient d'être travaillé. Ce qui conduit à faire noter dans le cahier de cours, à la suite de ce qui a été précédemment écrit et *avec les élèves que l'on sollicite pour cette synthèse* :

Si à un nombre on ajoute 199 puis on soustrait 99, alors on ajoute 100 à ce nombre :  
on le note :  $+199 - 99 = +100$  ;  
Si à un nombre on ajoute 17 puis on soustrait 15, alors on ajoute 2 à ce nombre :  
on le note :  $+17 - 15 = + 2$  ;  
Si à un nombre on ajoute 2017 puis on soustrait 17, alors on ajoute 2000 à ce nombre :  
on le note :  $+ 2017 - 17 = + 2000$  ;  
*Remarque, pour gagner du temps, l'une des ces phrases peut être remplacée par*  
 $\dots + 2017 - 17 = \dots + 2000$

#### **Etape 4 : travail de la technique et rencontre avec un élément technologique : la commutativité**

On continue par un entraînement à ce type de calculs sur des programmes de calcul, c'est-à-dire sur des calculs menés en raisonnant de la manière suivante : « si, à un nombre, on ajoute un deuxième nombre, puis on retranche un troisième, cherchons quelle opération on applique à ce premier nombre ; autrement dit le programme de calcul équivalent le plus simple ». On change l'ordre des calculs en cours d'exercices :

$$\begin{array}{lll}+ 7 - 11 = & + 5 - 2 = & + 8 - 13 = \\- 12 + 10 = & + 8 - 3 = & - 7 + 4 = \\- 11 + 7 = & - 2 + 5 = & - 13 + 8 = \\+ 10 - 12 = & - 3 + 8 = & + 4 - 7 =\end{array}$$

À l'issue de cette série de calculs une remarque est, en principe, faite par les élèves : lorsqu'on change l'ordre dans un programme de calcul, on obtient un programme de calcul équivalent, propriété que l'on note. Ce qui conduit à consigner dans le cahier de cours, et toujours *avec la collaboration des élèves* qui sont associés à définir ce qu'il sera *essentiel de retenir* :

## II. Un nouveau type de calculs

### 1. Exemples

$$+7 - 11 = -4$$
$$- 3 + 8 = + 5$$

### 2. Propriété de ce nouveau type de calculs

#### Propriété

Si on change l'ordre des opérations dans un programme de calcul contenant des additions et des soustractions, on obtient un programme de calcul équivalent.

#### Exemples

$$+7 - 11 =$$
$$- 11 + 7 =$$
$$- 3 + 8 =$$
$$+ 8 - 3 = + 5$$

### Etape 5 : travail de la technique et nouvelles rencontres

On poursuit les exercices sur les programmes de calcul :

$$\begin{array}{cccc} - 8 + 5 = & - 8 - 8 = & + 4 + 5 = & - 10 - 20 = \\ - 8 + 8 = & - 5 + 5 - 1 = & + 7 - 4 - 3 = & + 4 - 4 + 2 = \end{array}$$

Au cours de ces calculs, plusieurs nouvelles rencontres sont faites : deux soustractions ou deux additions successives, des programmes comprenant trois opérations, des programmes équivalents à 0, des programmes au cours desquels une étape donne 0. L'idée commence à *vivre* que ce que l'on fait sur les programmes de calcul s'apparente à ce qui se fait avec des nombres.

La reprise dirigée par le professeur de  $- 5 + 5 - 1 = -1$  permet d'écrire que  $0 - 1 = -1$ .

Celle portant sur  $+ 4 - 4 + 2 = + 2$  permet d'écrire que  $+ 2 = 2$  ; soit ce que nous savons être *l'identification d'un positif à sa valeur absolue*. Celle-ci s'opère en confondant l'opérateur « ajouter 2 » et le nombre 2, somme de 0 et de 2.

La confusion entre ces deux entités est *portée par l'écriture*. Dans un cas,  $+ 4 - 4 + 2 = + 2$  signifie qu'ajouter 4, puis soustraire 4 et ajouter 2 à un nombre revient à ajouter 2 à ce nombre. Dans l'autre, l'écriture équivalente  $0 + 2$  est interprétée à partir de ce qu'elle peut aussi désigner : la somme des entiers naturels 0 et 2. On explique alors aux élèves qu'en mathématiques on a décidé d'identifier  $+ 2$  à 2.

D'où l'institutionnalisation suivante :

#### Remarques :

a)  $-5 + 5 - 1 = -1$

Donc :  $0 - 1 = -1$

b)  $+ 4 - 4 + 2 = + 2$

$0 + 2 = + 2$

Or quand on écrit la somme  $0 + 2$ , on sait que celle-ci est égale à 2 :  $0 + 2 = 2$ . On décide alors que :  $+2 = 2$

En fait, pour symétriser  $\mathbf{N}$  afin de construire  $\mathbf{Z}$ , on n'a pas besoin d'utiliser le signe + pour désigner les naturels qui préexistent à la construction de  $\mathbf{Z}$  : ils permettent de le construire à partir d'une relation d'équivalence sur  $\mathbf{N} \times \mathbf{N}$  (cf. annexe 2) ! On pourrait donc se passer des signes + pour désigner les positifs ; ce qui se fait d'ordinaire en mathématiques. Comme le recours au signe +, pour noter les positifs, est en usage dans le système scolaire, nous avons dû en tenir compte : ce qui constitue l'une des raisons, mais non la principale, du choix fait de recourir aux programmes de calcul pour étudier les relatifs.

C'est désormais **au professeur** de dire que les entités que l'on manipule depuis le début et qui correspondent à des opérateurs additifs et soustractifs ressemblent beaucoup à de nombres.

## Etape 6 : addition des relatifs

**Question cruciale : Si ces entités étaient effectivement des nombres, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec? Pour cela, recherchons ce que c'est qu'un nombre, à quoi ça sert, ce qui se fait avec des nombres.**

Cette question est la **question fondamentale** qui engage ensuite à étudier les opérations et la comparaison sur les nombres relatifs ; rappelons que c'est elle qui engage les élèves de CM à étudier les rationnels dans l'ouvrage « Rationnels et décimaux dans la scolarité obligatoire » de Guy et Nadine Brousseau. Dans ce dernier cas, les rationnels sont vus comme mesures d'une grandeur mesurable : la longueur, qui est dans ce cas l'épaisseur d'une feuille de papier. Dans notre cas, et à cet instant du PER, il ne s'agit plus de mesurer des grandeurs avec des relatifs (une mesure est toujours positive) ; le sens peut toujours être retrouvé en revenant à la signification première d'opérateur additif dans des programmes de calcul. On se servira d'ailleurs de ce retour au sens premier dans la suite, lorsque ce sera nécessaire, pour établir certaines règles de calcul. Comme cela a été indiqué en introduction, on recherche à quelles lois doivent obéir les relatifs afin de pouvoir construire sur  $\mathbf{Z}$  (et sur  $\mathbf{D}$  pour lequel l'extension est implicitement faite) les deux opérations au programme de 5<sup>e</sup> ainsi que l'ordre. Ce fil logique sera poursuivi en 4<sup>e</sup> pour la multiplication et la division. On lance donc les élèves dans **la construction raisonnée** des règles opératoires dans  $\mathbf{Z}$  qui doivent être compatibles avec les propriétés qu'on leur connaît dans  $\mathbf{N}$  et dans  $\mathbf{D}_+$ . En cela nous nous démarquons fortement des propositions de la majorité des auteurs de manuels qui, soit assèment ces règles sans justification, soit les font constater en les montrant aux élèves tout en leur faisant croire que ce sont eux qui les ont trouvées ; ce qu'on nomme **l'ostension déguisée**. On peut dans ce cas s'interroger sur la qualité mathématique de l'activité dans laquelle on lance les élèves.

Quel que soit la voie didactique suivie pour amener les élèves à la rencontre avec les relatifs, les élèves auront à affronter une difficulté de nature épistémologique : la notion de classe ou de catégorie, dans sa version propre aux mathématiques. Il s'agit en mathématiques des notions de classe et donc de relation d'équivalence. Dans l'introduction, nous avons montré que l'appui sur les grandeurs non mesurables (les grandeurs repérables), à la difficulté conceptuelle relative aux classes d'équivalence, en ajoute une autre.

La proposition portée par le document d'accompagnement « Les nombres au Collège », en choisissant de se placer dans le cadre numérique et non pas dans celui des grandeurs, n'est pas très éloignée de la nôtre : les relatifs sont des nombres qui rendent la soustraction toujours possible. En utilisant de manière implicite la connaissance en acte de la régularité de tout nombre pour la soustraction, ce document suggère, page 8 : « Ainsi, si on s'intéresse à  $3,7 - 10,8$ , on peut écrire :  $3,7 - 10,8 = 0 - 7,1$  (on a soustrait  $3,7$  à chaque terme). Dans cette approche,  $-7,1$  est introduit comme notation de  $0 - 7,1$  et comme égal à  $3,7 - 10,8$ , et donc comme égal à bien d'autres différences, par exemple :  $1 - 8,1$  ;  $13,7 - 20,8...$  » On voit qu'on n'échappe pas aux notions de relation et de classe d'équivalence !

*Il ne faut donc pas passer rapidement sur cette question cruciale mais, au contraire, s'assurer que sa dévolution à la classe a eu lieu. C'est-à-dire que les élèves ont compris la question, s'en sont emparés, qu'ils savent qu'ils l'auront à traiter en grande partie seuls, sous la direction du professeur qui ne soufflera pas la réponse, mais qui reprendra éventuellement la main lorsqu'on butera sur une difficulté insurmontable à ce niveau. Ceci suppose que l'on passe du temps à la travailler, avec les élèves, sans l'escamoter. La qualité de « nombre » sera donc reconnue aux relatifs par les élèves à partir de la fonctionnalité attribuée aux nombres : à ce niveau de la scolarité, calculer et comparer.*

Les élèves disent que les nombres servent à compter (dans le sens de dénombrer), ce qui est vrai pour certains d'entre eux. On évite de s'engager dans une discussion sur les décimaux, voire sur les rationnels non entiers, et on demande ce que l'on a fait au cours de ces séances avec les nombres qui permettaient de simplifier des programmes de calcul. En principe, les élèves disent qu'on calcule avec les nombres ; c'est ce qui a été observé dans les classes où les élèves proposent les quatre opérations. Certains peuvent dire aussi qu'on compare. **Le professeur indique que l'on va donc étudier les calculs sur les nombres relatifs en commençant par l'addition et la soustraction sur des calculs simples.** Si les élèves l'ont proposé, il indique aussi que l'on poursuivra par l'étude des autres opérations et de la comparaison. Comme les propositions des élèves fusent pour proposer des calculs avec diverses valeurs pour les nombres, le professeur fixe les valeurs absolues.

Par exemple avec 7 et 2, **peut-on calculer la somme et la différence de +7 et +2, de +7 et -2, de -7 et -2 ?** Nous avons fait consigner toutes les écritures possibles de sommes et de différences avec des relatifs de valeur absolue 7 et 2. Il y en a 8 en respectant l'ordre suivant : d'abord 7 puis 2.

Les élèves s'engagent tout d'abord dans le calcul des sommes, parfois des différences. Un premier problème surgit : dans ces écritures, deux signes apparaissent parfois, ce qui implique que l'on écrive l'un des nombres entre parenthèses. Un deuxième problème provient de ce qu'on ne sait pas calculer certaines sommes. Le professeur indique qu'on va donc travailler sur ce dernier problème et qu'on attendra sa résolution avant de se lancer dans les calculs des différences dont certaines semblent, elles aussi, poser problème.

Pour  $+7 + (+2)$  et  $-7 + (+2)$ , le problème se règle en écrivant le positif sans le signe +.

D'une part :  $+7 + (+2) = 7 + 2 = 9$ , ou encore +9. On a donc identifié, pour ce cas, l'addition des positifs à l'addition dans  $\mathbf{N}$ .

D'autre part :  $-7 + (+2) = -7 + 2$  signifie, en revenant au sens primitivement donné, celui des programmes de calcul, qu'à un nombre on soustrait 7 puis on ajoute 2 : on trouve ainsi -5. Pour résoudre ce cas, on s'est donc appuyé sur la notion d'opérateur dans un programme de calcul, travaillée abondamment durant les séances précédentes.

Dans le calcul des sommes, les élèves utilisent les techniques connues sur les programmes de calcul et trouvent le résultat exact. Par exemple, ils disent que  $+7 + (-2)$  c'est le programme de calcul qui, à un nombre quelconque, revient à lui ajouter 7 et lui retrancher 2, donc à lui ajouter 5, qui peut se noter + 5 ; et le raisonnement est analogue pour  $-7 + (-2)$  où les élèves donnent le résultat -9 en disant qu'on retranche 7 puis 2. De ce fait, il est difficile de faire entendre aux élèves qu'un problème mathématique se pose en ce point ; à savoir que le raisonnement qu'ils ont utilisé, basé sur les programmes de calcul, s'applique à  $7 - 2$  mais que son extension à  $+7 + (-2)$  mérite d'être interrogée, de même que la transformation de  $-7 + (-2)$  en  $-7 - 2$ . Néanmoins, on s'appuiera dans certains cas sur l'absence de distinction entre signe + et addition, signe - et soustraction. Cette identification est portée par la pratique, devient routinière, est celle qui est faite usuellement dès que l'on maîtrise les calculs sur les relatifs.

Comme indiqué précédemment, le choix de devoir écrire  $-7 + (-2)$  au lieu de  $-7 - 2$ , ou  $(+7) + (-2)$  au lieu de  $7 - 2$ , est sans doute l'héritage d'une transposition didactique ancienne où l'on enseignait au Collège une construction des ensembles de nombres et donc du groupe commutatif  $(\mathbb{Z}, +)$ . La notation a perduré dans des programmes récents de ce niveau, même lorsqu'elle n'est pas nécessitée par l'écriture d'un calcul et alors que l'enseignement de cette construction a disparu. Respectant le cadre des programmes, nous sommes conduits à l'utiliser et, au-delà, à tenir compte des soubassements mathématiques qu'elle transporte avec elle.

Il faut maintenant s'entraîner et évaluer la pertinence des deux techniques que l'on vient de trouver dans des calculs du même type que l'on contraste avec des calculs où ces deux techniques ne peuvent s'appliquer :

#### Consigne 5

Calculer les sommes suivantes :

$$+4,3 + (+6,7) ; -9 + (+2) ; -4 + (+10) ; +7 + (-2) ; -7 + (-2) ; +7 - (-2) ; -7 - (-2)$$

Bien que les connaissances dont ils disposent ne le leur permettent pas, les élèves donnent des résultats pour les sommes  $+7 + (-2)$  ;  $-7 + (-2)$ , sans pouvoir les justifier ni les valider, mais rencontrent des difficultés plus profondes pour  $+7 - (-2)$  et  $-7 - (-2)$ . Par exemple, ils disent que  $7 - (-2)$  donne 5 ; cette réponse est portée par la perception du signe  $-$  et des écritures 7 et 2. Le professeur fait alors remarquer qu'il serait étonnant que la somme et la différence de 7 et de -2 dans ce cas, soient toutes deux égales à 5, puisque cela ne se produit pas dans les cas bien connus de l'addition et de la soustraction des entiers :  $7 - 2 \neq 7 + 2$  !

Quoi qu'il en soit, les élèves ont commencé à se rendre compte que ce qui se faisait avec des nombres, par exemple des additions, peut être fait dans certains cas avec certains programmes de calcul qui correspondent à l'addition ou à la soustraction d'un nombre. On ne sait pas ajouter dans certains cas et on n'a pas encore vu ce qu'il en était pour d'autres opérations, ni même si cela était possible.

Néanmoins, c'est au professeur de dire que les mathématiciens ont décidé d'appeler « nombres relatifs » ces opérateurs additifs ou soustractifs.

On consigne cela dans le cours :

### III. De nouveaux nombres : les nombres relatifs

#### Les nombres négatifs, les nombres positifs, les nombres relatifs

##### Définition :

En mathématiques, on a décidé de considérer -1, -2, -3 ... comme de nouveaux nombres. Ils sont affectés d'un signe « - » et on les appelle « *nombres négatifs* ».

##### Remarques :

a) On avait vu que :  $-5 + 5 - 1 = -1$

Donc :  $0 - 1 = -1$ .

**Le nombre -1 correspond au programme de calcul « à un nombre, on ajoute 0 et on retranche 1 »**

b) On avait vu que :  $+4 - 4 + 2 = +2$

Donc :  $0 + 2 = +2$

**Le nombre +2 correspond au programme de calcul « à un nombre, on ajoute 0 et on ajoute 2 »**

Or quand on écrit la somme  $0 + 2$ , on sait que celle-ci est égale à 2 :  $0 + 2 = 2$ . On décide alors que :  **$+2 = 2$**  (ce qui permet l'identification de  $\mathbf{Z}_+$  à  $\mathbf{N}$ ).

**Définitions :**

a) Les nombres entiers naturels peuvent donc être notés avec un signe + ; on les appelle des **nombres positifs**.

b) Nombres positifs et négatifs sont appelés « **nombres relatifs** » (obligé de signaler cela car le terme de nombre relatif est explicitement utilisé dans le programme) ; ils sont écrits avec un signe + ou – et un nombre entier ou décimal que l'on appelle la **valeur absolue**.

**Remarque :**

Le nombre 0 est un nombre à la fois positif et négatif (un programme de calcul ne change pas s'il est équivalent à ajouter ou soustraire 0) : on le note donc sans signe.

*Même si le terme de valeur absolue n'est pas au programme, nous avons décidé de l'utiliser car il remplit une fonction de désignation bien commode. Bien plus commode que le terme de « distance à zéro », expression ambiguë dans la mesure où elle renvoie à plusieurs cadres mathématiques distincts : le cadre géométrique et celui des grandeurs à partir du mot « distance », le cadre arithmétique à partir du mot « zéro ». À ce moment du parcours où il n'a pas été question de droite graduée (nous en avons expliqué la raison en introduction), l'usage de cette expression nous apparaît encore plus contestable que d'ordinaire et entraîne à la confusion chez les élèves : qu'est-ce qu'une distance à un nombre, alors qu'on ne connaît guère que la distance à un point ? Les réticences qui sont apparues il y a quelques années, concernant l'utilisation de la valeur absolue, sont liées non pas à sa désignation, mais à l'usage de la valeur absolue de  $x$ ,  $x$  désignant un relatif quelconque (donc « doté » d'un signe que l'écriture  $x$  « cache »), puis aux calculs dans lesquels figurent des valeurs absolues notées  $| \cdot |$ . Ces calculs, qui ont pu un temps trouver à vivre à travers la résolution d'équations du 1<sup>er</sup> degré avec valeurs absolues au niveau du Lycée, ne sont évidemment pas menés au niveau du Collège. Ils ne risquent donc pas d'entraîner ce genre d'erreurs. On se garde toutefois de prononcer des phrases comme « la valeur absolue d'un nombre, c'est le nombre sans son signe », tout aussi fausses dans leurs transpositions recourant à l'expression « distance à zéro » !*

## Troisième séquence

### Etablir les règles de calcul de la somme de deux relatifs

**Durée : entre 2 et 4 séances de 55 min**

Comme on l'a dit en préambule à ce document, avant d'aborder l'entrée dans les relatifs, il est nécessaire que les élèves aient tout d'abord travaillé la définition de la différence<sup>6</sup> (dans **N** ou dans **D+**) qui doit être une connaissance disponible, élément non problématique, faisant partie du « milieu » des connaissances stabilisées, disponibles, non problématiques :

La différence des nombres  $a$  et  $b$  est le nombre  $d$  tel que  $a + d = b$  et on note  $d = b - a$ .

La poursuite du parcours concerne désormais la question de l'établissement de règles de calcul, tout d'abord celles de l'addition. Plusieurs voies se présentent pour cette opération et sont exposées dans ce qui suit ; nous en montrons trois, la dernière nécessitant une forte intervention du professeur. C'est au professeur de décider laquelle conviendra le mieux à la gestion de sa classe et à la réussite de l'apprentissage pour ses élèves.

Comme on l'a noté précédemment, l'observation en classe montre que certaines propositions concernant les sommes obtenues à partir de relatifs de valeurs absolues 7 et 2 peuvent être disqualifiées lors d'un débat entre élèves. Parmi les quatre réponses généralement proposées et que le professeur a fait noter au tableau pour la somme  $7 + (-2)$ , on relève :

$$7 + (-2) = +9 = 9 ; 7 + (-2) = -9 ; 7 + (-2) = +5 = 5 ; 7 + (-2) = -5.$$

Les propositions donnant pour résultat 9 ou -9 sont assez rapidement abandonnées. Il est par exemple douteux que  $7 + (-2) = +9 = 9$  car on sait que +9 est le résultat de l'addition  $7 + (+2)$ . De même -5 est plutôt le résultat de l'addition  $-3 + (-2)$ . L'idée émerge que  $7 + (-2) = +5 = 5$ . Le professeur indique qu'il reste à le prouver ; ce qu'on va tenter de faire.

Dans les lignes qui suivent, plusieurs possibilités sont proposées, que le professeur pourra choisir en fonction de ce qu'il sait des réactions de la classe. La première possibilité utilise l'introduction de 0 dans le calcul. La seconde consiste à décomposer additivement 7.

#### **1<sup>re</sup> possibilité pour $7 + (-2)$ : réutiliser la décomposition additive et rencontrer la définition de l'opposé d'un nombre**

##### **Etape 1 : la décomposition additive**

La décomposition additive des nombres, étudiée en primaire, a été réutilisée par les élèves lorsqu'il leur a fallu justifier que, dans un calcul mental comme  $4374 + 61 - 62$ , il suffisait de soustraire 1 à 4374. On écrivait alors  $4374 + 61 - 62 = 4373 + (1 + 61) - 62$  en décomposant 4374 en  $4373 + 1$ .

---

<sup>6</sup> Les élèves résolvent des problèmes additifs « à trous » dès le cycle 2 de l'école primaire. Ils sont du type mis en évidence dans la classification proposée par Gérard Vergnaud (état initial, transformation, état final) et reprise page 57 du document d'accompagnement *Le nombre au cycle 2* : [http://cache.media.eduscol.education.fr/file/ecole/00/3/Le\\_nombre\\_au\\_cycle\\_2\\_153003.pdf](http://cache.media.eduscol.education.fr/file/ecole/00/3/Le_nombre_au_cycle_2_153003.pdf)

À l'issue des diverses propositions de réponses données pour  $7 + (-2)$ , l'idée a émergé, au moins pour une partie des élèves, que cette somme est égale à 5 ou +5. Les élèves savent que la vérification de cette hypothèse nécessite sa démonstration.

Certains ont donc l'idée de décomposer 7 en  $5 + 2$ .

On a alors :  $7 + (-2) = 5 + 2 + (-2)$ .

Apparemment, certains élèves répondent sans hésiter que  $2 + (-2) = 0$ . Ils en concluent que  $7 + (-2) = 5 + 2 + (-2) = 5 + 0 = 5$ .

La difficulté qui surgit est de faire vivre auprès des élèves la nécessité de **prouver l'affirmation «  $2 + (-2) = 0$  »**, perçue comme évidente et qui, si elle est vraie, entraînerait peut-être aussi le fait que les sommes de relatifs opposés,  $8 + (-8)$ ,  $2 + (-2)$ ,  $5 + (-5)$ , etc. sont nulles, et si c'est le cas, à se demander pourquoi. On remarque que l'on n'avait pas à se poser ce problème auparavant puisque la réponse à la question faisait intervenir le retour au sens donné aux programmes de calcul : cela était possible du fait que le premier terme de la somme était négatif  $-8 + 8$  devenait  $-8 + (+8)$ , et  $-5 + 5$  devenait  $-5 + (+5)$ , etc.

L'affirmation  $2 + (-2) = 0$  n'est donc qu'une hypothèse que l'on va tester et tenter de valider d'un point de vue mathématique.

## **Etape 2 : un moment technologique, justifier et expliquer pourquoi la somme de deux opposés est égale à 0**

La question cruciale devient donc : ***Peut-on démontrer que lorsque qu'on ajoute à un nombre son opposé, alors la somme est nulle ? Peut-on le démontrer pour  $2 + (-2)$  par exemple ?***

Une difficulté didactique surgit ***qui conduit à un passage délicat.***

La question est « la somme  $2 + (-2)$  est-elle égale à 0 ? ». Il faut transformer la question de telle manière qu'elle devienne « quel est le nombre qui ajouté à 2 donne une somme égale à 0 ? », qui conduira à répondre à la question « est-ce effectivement -2 qui, ajouté à 2, donne 0 ? ».

On transforme ainsi la question «  $2 + (-2) = 0$  ? » en résoudre : « l'équation  $2 + x = 0$  », donc trouver  $x$  qui, ajouté à 2, donne 0. A ce moment du cursus, en 5<sup>e</sup>, si l'usage de lettres pose problème, l'équation est écrite,  $2 + \dots = 0$ , et se dit quel est le nombre qui ajouté à 2 donne 0 ?

***Par définition de la différence***, définition que l'on étend désormais puisque « qu'existant l'interdit » de ne pouvoir soustraire à un nombre un nombre plus grand, l'écriture  $2 + x = 0$ , ou  $2 + \dots = 0$ , signifie que  $x$ , ou le nombre représenté par  $\dots$ , est la différence de 2 et 0. Ce qu'on note :  $x = 0 - 2$ .

Ce passage apparaît ***épistémologiquement inévitable***, puisque c'est précisément l'une des raisons d'être des nombres négatifs : la possibilité de l'extension de la soustraction dans  $\mathbb{N}$ . Il ne peut guère être didactiquement accepté que si les élèves ont, au préalable, abondamment pratiqué la résolution dans  $\mathbb{N}$  d'équations du type :  $a + x = b$ , soit sous forme algébrique (le  $x$  étant souvent remplacé par des  $\dots$ ), soit à partir de problèmes, géométriques par exemple.

Arrivés à  $x = 0 - 2$ , la réponse  $x = -2$  doit apparaître puisqu'établie dès les remarques qui succèdent à la définition des négatifs, ce qui suppose un certain entraînement des élèves (mais les élèves « savent » qu'établir que « -2 est la solution du problème » est effectivement le but visé). Rappelons que le résultat  $0 - 2 = -2$  a été établi à partir de la considération des relatifs comme « opérateurs », à l'issue du travail mené sur les programmes de calcul. *On a identifié l'opérateur - qui apparaît dans le programme de calcul  $0 - 2$  à la différence  $0 - 2$ .*

### Etape 3 : une institutionnalisation

On vient donc de démontrer que  $2 + (-2) = 0$ . Il en est de même pour  $3 + (-3)$ ,  $1 + (-1)$ , etc.

Remarquons que  $-2 + (+2) = -2 + 2 = 0$  (puisque  $+2 = 2$ ), ce qui établit la **commutativité pour l'addition des opposés**.

*C'est à partir de ce travail que l'on pourra faire noter la définition des opposés, dans la partie « leçon »*

On a établi que  $2 + (-2) = 0$  et on a aussi  $-2 + (+2) = -2 + 2 = 0$ .

On dit que **+2 et -2 sont des nombres relatifs opposés**.

Il en est de même pour -3 et +3, -7,5 et +7,5...

### 2<sup>e</sup> possibilité pour $7 + (-2)$ : réutiliser la définition des nombres relatifs comme programmes de calcul

Il est possible que des élèves reviennent à la définition des nombres relatifs donnée antérieurement en termes de programmes de calcul. On avait établi que  $0 - 1 = -1$ . Autrement dit, que l'opérateur -2, qui apparaît dans le calcul  $7 + (-2)$ , est équivalent à  $0 - 2$ . Le calcul devient alors :

$$7 + (-2) = 7 + (0 - 2)$$

En ce point, l'associativité  $a + (b - c) = (a + b) - c$ , utilisée à plusieurs reprises dans le calcul de  $4374 + 61 - 62$  :

$$= (4373 + 1) + 61 - 62$$

$$= 4373 + (1 + 61) - 62$$

$$= 4373 + 62 - 62$$

$$= 4373 + (62 - 62)$$

permet d'écrire :

$$7 + (-2) = 7 + (0 - 2) = (7 + 0) - 2 = 7 - 2 = 5$$

**Une variante** qui utilise, elle-aussi, la définition d'un relatif donnée à partir des programmes de calcul et l'associativité, consiste à écrire :  $7 + (-2) = 7 + (2 - 4) = 7 + 2 - 4 = 9 - 4 = 5$ .

**Remarque :** Le même recours à la définition par programme de calcul et associativité permet de prouver que  $2 + (-2) = 0$ .

On écrit :  $2 + (-2) = 2 + (0 - 2) = (2 + 0) - 2 = 2 - 2 = 0$ . D'où l'on déduit que 2 et -2 sont des nombres opposés.

Mais la question de la rencontre avec la définition de l'opposé d'un nombre n'est pas portée par la nécessité du calcul de  $7 + (-2)$ , comme c'était le cas au cours de la voie empruntée lors de la 1<sup>re</sup> possibilité, où la question était nécessairement rencontrée.

### 3<sup>e</sup> possibilité pour $7 + (-2)$ : une forte intervention du professeur

Le professeur annonce que l'on est engagé dans un passage délicat et qu'il y a une méthode que l'on va étudier ensemble. Elle repose sur une idée que l'on aurait sans doute mis du temps à trouver. Il s'agit en effet d'introduire 0 dans le calcul de  $+7 + (-2)$ .

On écrit ainsi que :

$$\begin{aligned} &+7 + (-2) \\ &= 7 + (-2) \\ &= 7 + 0 + (-2) \end{aligned}$$

Mais avant d'aller plus avant, il faut s'entraîner à écrire 0 à partir de deux nombres opposés ; ce sont des nombres que l'on a déjà rencontrés.

On a vu par exemple que  $-8 + 8 = 0$ ,  $-5 + 5 = 0$  et  $+4 - 4 = 0$ .

On demande aux élèves de réécrire ces égalités avec des additions ou soustractions de relatifs [ $-8 + (+8) = 0$ ,  $-5 + (+5) = 0$ ,  $+4 - (+4) = 0$ ], puis de trouver des écritures du même type avec d'autres nombres, et ensuite de réfléchir judicieusement afin qu'elle puisse nous servir pour remplacer 0 dans le calcul de  $7 + 0 + (-2)$ . Deux possibilités sur le choix des nombres ont une forte probabilité d'apparition : utiliser 7 et son opposé, ou -2 et son opposé. Ce qui donne quatre écritures possibles :  $-7 + 7$ ,  $+7 - 7$ ,  $+2 - 2$  et  $-2 + 2$ .

Il faut donc tester ces quatre possibilités, et la classe peut être divisée en quatre pour cela.

$7 + 0 + (-2) = 7 - 7 + 7 + (-2) = 7 + (-2)$ . Le problème n'est pas résolu.

$7 + 0 + (-2) = 7 + 7 - 7 + (-2) = 14 - 7 + (-2) = 7 + (-2)$ . Le problème n'est pas résolu

$7 + 0 + (-2) = 7 + 2 - 2 + (-2) = 9 - (+2) + (-2) = 9 - 2 + (-2) = 7 + (-2)$ . Le problème n'est pas résolu

$7 + 0 + (-2) = 7 - 2 + 2 + (-2) = 5 + 2 + (-2) = 7 + (-2)$ . Le problème n'est pas résolu, mais on retrouve 5 dans l'une de ses étapes ; ce nombre ayant été envisagé comme résultat du calcul, sans qu'on l'ait prouvé.

Il reste pour cela à prouver que  $2 + (-2) = 0$ .

On retrouve alors l'étape indiquée pour la première possibilité, qui consiste à étudier la question de l'opposé d'un nombre.

**Le dernier cas problématique pour l'addition est celui d'une addition du type  $-7 + (-2)$ , ou encore écrite  $-7 + (-2)$**

### *Remarque sur l'usage des signes*

En typographie mathématique, les usages différents des symboles « - » et « - » renvoient à la distinction classique entre soustraction et négatif ; voire à l'opposé d'un nombre dans l'écriture  $-a$  par exemple. On ne rencontrera pas cette dernière écriture pour l'opposé dans ce PER qui ne recourt pas aux écritures littérales.

Comme on sait, les nombres relatifs sont définis dans ce PER à partir de la simplification de programmes de calcul additifs. Dans les programmes de calcul utilisés, on écrit donc des soustractions à l'aide du symbole « - » et non pas « - », et les additions sont notées grâce au symbole « + » qui ne se distingue pas, en typographie, du « + » des positifs, ou encore de celui de  $+a$ .

Les négatifs sont définis à partir d'une soustraction à 0 :  $x + 0 - 2$  par exemple pour  $-2$ . Cette écriture énonce que ce programme de calcul revient à soustraire 2 à un nombre  $x$  auquel on avait ajouté 0. On le note  $-2$  et non  $-2$ .

Dans la réalité des classes, et non pas dans le texte du PER, on opère une confusion volontaire d'écriture à propos des symboles «  $-$  » et «  $-$  ». Les élèves ne la remarquent sans doute pas car elle tend à être invisible dans les écritures manuscrites, au tableau ou dans les cahiers. Cette « confusion » n'en est en réalité pas une dans le cadre de ce PER où les sens attribués aux signes, comme les signes eux-mêmes, sont distingués. On y écrit  $-2 = 0 - 2$ , mais la distinction de signes n'est pas faite auprès des élèves ; l'essentiel étant qu'ils sachent passer de  $-2$  à  $0 - 2$ .

**Question cruciale :** Le professeur indique qu'il reste à résoudre un calcul d'un type général, représenté par le cas particulier  $-7 + (-2)$ . Certains pensent que cette somme est égale à  $-9$ , d'autres à  $-5$ . Qui a une idée pour trancher entre ces deux réponses, c'est-à-dire pour prouver le résultat ?

Ont vécu dans la classe certaines des trois techniques ayant permis de régler le cas précédent du calcul  $7 + (-2)$ . Il y a des chances que, mis face au cas  $-7 + (-2)$ , un certain nombre d'élèves essaient de s'en inspirer.

Dans l'ordre, on peut reprendre les techniques précédentes.

### 1<sup>re</sup> possibilité : la décomposition additive et l'associativité

Deux décompositions de  $-7$  ont des chances d'apparaître :  $-7 = -9 + 2$  et  $-7 = -5 - 2$ .

- Avec  $-7 = -9 + 2$ , on a  $-7 + (-2) = -9 + 2 + (-2) = -9 + [2 + (-2)] = -9 + 0 = -9$   
Avoir auparavant étudié l'opposé d'un nombre permet de conclure le calcul
- Avec  $-7 = -5 - 2$ , on a  $-7 + (-2) = -5 - 2 + (-2)$   
Surgit en ce point ce qui peut apparaître comme une difficulté :  $-2 + (-2) = ?$

### 2<sup>e</sup> possibilité : réutiliser la définition des nombres relatifs comme programmes de calcul

On a :

$$\begin{aligned} & -7 + (-2) \\ &= -7 + (0 - 2) \\ &= -7 + 0 - 2 \\ &= -7 - 2 \\ &= -9 \end{aligned}$$

Cette technique semble être la plus simple à mettre en œuvre par les élèves

### 3<sup>e</sup> possibilité : une forte intervention du professeur

On a :

$$\begin{aligned} & -7 + (-2) \\ &= -7 + 0 + (-2) \\ &= -7 - 2 + 2 + (-2) \text{ En ce point, on retrouve l'usage de la définition de l'opposé pour } +2 + (-2) \\ &= -9 + 0 \\ &= -9 \end{aligned}$$

On peut désormais demander le calcul de  $+3 + (-5)$ , par exemple en se servant de l'une des trois techniques précédemment étudiées.

## Quelle que soit la voie précédemment choisie, travail de la technique

On s'exerce sur d'autres calculs dans lesquels on *recourt à l'une ou l'autre des techniques précédemment rencontrées, selon le choix fait par le professeur, avec une insistance portée sur l'intervention de 0 comme addition d'opposés* :

$$10 + (-15) =$$

$$-9 + (-3) =$$

$$-5 + (+8) =$$

$$-3 + (-9) =$$

$$8 + (-5) =$$

$$-15 + (+10) =$$

$$-4 + (+9) =$$

$$5,3 + (-5,12) =$$

$$9 + (-4) =$$

Outre le fait de s'entraîner à la maîtrise de la technique que l'on vient de construire et de justifier, cet exercice a pour but de faire éprouver que le recours systématique aux techniques s'appuyant sur « le passage par 0 » ou sur la décomposition, est parfois *coûteux*. On a donc intérêt à observer des régularités qui permettent de dégager la règle de calcul qui sera beaucoup plus économique. La commutativité, que l'on soupçonne en remarquant l'égalité des résultats obtenus en commutant les termes, est admise. Mais il est possible d'en faire une démonstration orale puisque l'écriture de la technique de calcul de la somme, consignée dans le cahier de cours, la contient.

Il est temps de consigner ce que l'on vient de trouver dans le cahier de cours, après que l'on a observé les régularités permettant de dégager une règle de calcul.

### Etape 8 : institutionnalisation

#### 2. L'addition des nombres relatifs

**a. Définition :** Etant donnés deux nombres relatifs, on peut calculer leur *somme* qui est un nombre relatif. L'opération qui, à deux relatifs, associe leur somme s'appelle *l'addition des relatifs*.

Différents cas sont possibles :

. On ajoute *deux nombres positifs*

$+7 + (+4) = 7 + 4 = 11 = +11$  on obtient un nombre positif dont la valeur absolue est la somme des valeurs absolues

. On ajoute *deux nombres négatifs*

$-7 + (-4) = -7 - 4 = -11$  on obtient un nombre négatif dont la valeur absolue est la somme des valeurs absolues

. On ajoute *un négatif et un positif*

$$-7 + (+2) = -7 + 2 = -5$$

$$-7 + (+10) = -7 + 10 = +3 = 3$$

. On ajoute *un positif et un négatif*

$$+7 + (-2) = 7 - 2 = 5$$

$$+7 + (-10) = 7 - 10 = -3$$

#### Règle de calcul de la somme de deux relatifs

Si on ajoute deux relatifs de *même signe*, leur somme est le relatif de même signe qui a pour valeur absolue la somme des valeurs absolues

Si on ajoute deux relatifs de *signes différents*, leur somme est le relatif de signe le signe de celui qui a la plus grande valeur absolue et de valeur absolue la différence des valeurs absolues

### **b. Deux remarques importantes**

. L'addition des relatifs est *commutative* : on ne change pas la valeur de la somme lorsqu'on change l'ordre des termes d'une addition

. On s'aperçoit que  $10 + (-15) = 10 - 15$  ;  $-15 + (+10) = -15 + 10$  ;  $-9 + (-3) = -9 - 3$  ;  
 $-3 + (-9) = -3 - 9$  ;  $-5 + (+8) = -5 + 8$  ;  $8 + (-5) = 8 - 5$ .

Dans une somme de relatifs, il est plus simple de ne pas écrire les parenthèses et les signes + d'addition afin de pouvoir calculer comme dans les programmes de calcul

**c. Définition :** On sait que  $-8 + (+8) = 0$ , que  $-5 + (+5) = 0$ , que  $+4 + (-4) = 0$ . On dit que **-8 est l'opposé de +8** et que +8 est l'opposé de -8, ou encore que +8 et -8 sont *opposés*.

Il en est de même pour -5 et +5 qui sont deux nombres opposés, pour +4 et -4 qui sont deux nombres opposés.

### **Etape 9 : travail de la technique**

#### **Exercices**

Calculer les sommes suivantes :

$-5 + (+9)$  ;  $-10,5 + (-4,9)$  ;  $9,8 + (-9,75)$  ;  $+9,3 + (+7,7)$  ;  $-4,5 + (+4,25)$  ;  $(+4,2) + (-7)$  ;  
 $(-7) + (+4,2)$  ;  $(-10,3) + (+10,3)$  ;  $(+10,3) + (-10,3)$  ;  $-10,3 + (+4,2)$  ;  $-10,3 + (-4,2)$  ;  
 $(-7) + (-10) + (+4,2) + (+7)$  ;  $4,9 + (-2,6)$  ;  $(-7,65) + (+7,7)$  ; etc.

Calculer :

$-7,25 + 4,39 + (-5,75) + 2,31$  ;  $8,63 + (-9,23) + (-10,5) + (+10,1)$  ;  
 $-3 + 7 + 10,2 - 5$  ;  $+8 + 3 - 11$  ;  $-15 - 3,6$  ;  $-2 + 3 - 5$  ;  $-6 + 4,2 + 0,8$  ; etc.

*On peut désormais donner aux élèves les exercices classiques d'entraînement au calcul de la somme de deux relatifs.*

## Quatrième séquence

### Etablir les règles de comparaison et de calcul de la différence de deux relatifs

**Durée : entre 6 et 7 séances de 55 min**

Le professeur indique qu'après être parvenus à additionner des relatifs, et puisqu'on cherche à savoir si l'on peut travailler avec les relatifs comme on le faisait avec les nombres que l'on connaissait auparavant, on va maintenant chercher à les comparer.

#### Etape 1 : S'accorder sur ce qu'on entend par « comparer, comparaison »

##### **Question : Que signifie comparer deux nombres ?**

Les élèves ayant donné diverses réponses (qu'il y en a un plus grand ou plus petit que l'autre) ou des résultats qui ne correspondent pas à la question (qu'il y a des entiers, des décimaux, des relatifs, des fractions, etc.), on s'accorde sur le fait que cela consiste à déterminer le plus grand ou le plus petit de deux nombres donnés, ou encore à ranger par ordre croissant ou décroissant plusieurs nombres.

#### Etape 2 : rencontre avec le type de tâches dans un cas simple

Le professeur demande alors : *Parmi les relatifs, sait-on déjà comparer entre eux des nombres d'un certain type : lesquels ?*

Les élèves se souviennent de l'identification des positifs aux nombres arithmétiques, ce qui permet d'ordonner les positifs. On demande que les élèves donnent des exemples à l'issue desquels on peut faire noter :

On range les positifs de la même manière que précédemment :

**Exemple :**  $+6,5 > +6,35$  car  $6,5 > 6,35$ .

#### Etape 3 : construction de la technique et de la technologie pour le cas de deux négatifs

##### **Question cruciale : Quels sont les autres types de nombres qui restent à comparer ?**

Les élèves donnent des exemples de couples de négatifs ou de couples constitués d'un positif et d'un négatif. Le professeur décide qu'on va étudier tout d'abord le cas de deux négatifs, par exemple -9 et -7. *La question devient : quel est le plus petit (ou le plus grand) de ces deux nombres ?*

Il y a des chances qu'après quelques temps de réflexion, les élèves recourent à l'analogie à partir de leurs éventuelles connaissances anciennes qu'ils transposeront : températures, dates avant J-C, ascenseurs, niveaux sous la mer, pertes... Mais certains disent que -9 est le plus grand. Il y a alors un débat vite tranché, par exemple par le recours aux températures.

*La question qui arrive, et qui est portée par le professeur, est alors la suivante : Comment peut-on être mathématiquement certain de la validité de la réponse que l'on donne ? Comment prouver, avec des mathématiques, la validité de ce que l'on avance ?*

Les élèves cherchent, et une grande partie d'entre eux ne trouvent pas. Néanmoins, très souvent, un élève propose d'ajouter le même nombre aux deux nombres à comparer afin d'obtenir des positifs car ce sont des nombres qu'on sait comparer, par exemple :

$$-9 < -7 \text{ car } -9 + 10 = 1 < -7 + 10 = 3.$$

*Il est difficile de savoir d'où vient cette connaissance en acte (l'écart ne change pas quand on ajoute le même nombre aux deux autres) de la compatibilité de la relation d'ordre avec l'addition. On peut formuler deux hypothèses. La première est le recours à des techniques numériques que les élèves ont travaillées en primaire, et qui relèvent de la décomposition additive des nombres. Ces savoir-faire sont enseignés et appris dès le CP. Par exemple : «  $19 < 22$  car d'une part  $19 = 7 + 10 + 2$ , d'autre part  $22 = 7 + 10 + 5$  et  $2 < 5$  ». La seconde est la conversion possible, vers les mathématiques, d'une réalité sociale expérimentée ou évoquée. Si un enfant A est plus petit qu'un enfant B, lorsque les deux montent sur une chaise de même hauteur, l'ordre ne change pas : l'enfant A reste plus bas que l'enfant B.*

Si un élève indique l'une de ces techniques, alors évidemment, le professeur s'appuie sur cette proposition. Il s'en sert afin que cet élève l'enseigne à la classe. Ceci se produit parfois, comme on a pu l'observer. Dans le contraire, le professeur indique alors qu'une technique consiste à se ramener à quelque chose de connu sur la comparaison.

**Questions : que connaît-on déjà sur la comparaison des nombres relatifs et qui pourrait nous aider ?** On attend évidemment que les élèves répondent que l'on sait comparer des positifs. Ce qui induit la question : **Comment pourrait-on se ramener à des nombres positifs à partir de -9 et -7 ?**

Les élèves recherchent, tâtonnent et peut-être essaient d'ajouter. Le professeur rassemble les propositions émises par les uns et les autres et, si cela n'est pas apparu dans les propositions des élèves, propose de trouver un nombre qui, ajouté à -7 et à -9, donne deux sommes positives afin de pouvoir les comparer. **Lequel choisir ?**

Les élèves décident sans trop de difficultés que ce nombre doit être supérieur ou égal à 9 ; par exemple 10.

On a ainsi :  $-7 + 10 = 3$  et  $-9 + 10 = 1$ . Comme  $3 > 1$ , alors c'est que  $-7 > -9$ . Ce qui confirme le résultat conjecturé par certains dans la classe.

#### **Etape 4 : maîtrise de la technique qui vient d'émerger et travail de la technique d'addition**

On peut alors utiliser cette technique pour comparer -1,5 et -1,35, etc., -0,43 et -0,58.

On obtient ainsi une validation des résultats tout en faisant travailler d'une autre manière la somme des relatifs et la notion d'opposé (puisque'il faut que le nombre ajouté soit supérieur à la valeur absolue du plus petit des négatifs).

#### **Etape 5 : extension de la technique pour « tous » les entiers négatifs**

**Nouvelle question : Qu'en est-il pour les autres entiers négatifs : par exemple pour les entiers négatifs fabriqués avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ? Peut-on les ordonner, c'est-à-dire les ranger dans l'ordre croissant ?**

On applique de nouveau la technique par addition qui permet la vérification d'un ordre déjà conjecturé, et qui peut s'écrire :  $-10 < -9 < -8 < -7 < -6 < -5 < -4 < -3 < -2 < -1$ .

### Etape 6 : institutionnalisation

Etant convaincus que le plus petit de deux négatifs est celui de plus grande valeur absolue, on en conclut que l'on sait désormais comparer deux négatifs, quels qu'ils soient. Ce que le professeur peut institutionnaliser de la manière qu'il décidera de choisir, par exemple en écrivant que :

**Le plus petit (respectivement le plus grand) de deux nombres négatifs est celui qui a la plus grande (respectivement la plus petite) valeur absolue**

#### Exemples :

$-9,4 < -9,1$  car  $9,4 > 9,1$

$-8,02 > -8,2$  car  $8,02 < 8,2$

### Etape 7 : construction de la technique pour un négatif et un positif

La question qui demeure et qui vient naturellement des élèves est désormais : ***Comment faire pour comparer un positif et un négatif ?***

Des élèves peuvent vouloir mettre en œuvre la technique « d'addition du nombre adéquat » pour  $-9,5$  et  $+3,01$ , puis  $-4,9$  et  $+6,2$  ; etc. D'autres peuvent émettre l'idée qu'un négatif est toujours inférieur à 0 (exemple des températures) et donc toujours inférieur à un positif, car les positifs sont tous supérieurs à 0. Deux voies s'ouvrent ainsi selon ce que propose la classe :

**Voie 1 :** Est de fait institutionnalisée la technique qui consiste à ajouter le même nombre, de façon à comparer deux nombres positifs. Après que les élèves ont obtenu un résultat pour  $-9,5$  et  $+3,01$  ;  $-4,9$  et  $+6,2$  par exemple, le professeur suggère : ***En se servant de cette technique, peut-on comparer tous les relatifs entre eux, c'est-à-dire les ordonner, par exemple dans l'ordre croissant ? Commençons par les entiers relatifs tels que : 0 ; +1 ; -1 ; +2 ; -2 ; ... ; +10 ; -10.***

Les élèves se servent des connaissances acquises lors de la comparaison sur les exemples précédents. Il est possible qu'ils organisent leur travail en distinguant entre les positifs d'une part et les négatifs d'autre part, ou qu'ils comparent les nombres deux à deux sans rangement particulier. Mais il est possible qu'ils s'aperçoivent alors qu'un négatif est toujours inférieur à un positif.

On savait déjà que  $0 < 1 < 2 < 3 < 4 < 5 \dots$ . La question qui se pose maintenant est donc celle du lien entre ces deux suites ordonnées de relatifs. Une fois encore, il y a des chances que les élèves sachent ou conjecturent que  $-1 < 0$ . Cette connaissance reste à démontrer d'un point de vue mathématique. On utilise de nouveau la technique, par exemple en ajoutant à  $-1$  et 0 le nombre 2. Ceci donne :  $-1 + 2 = 1$  et  $0 + 2 = 2$ . Or  $1 < 2$ , donc  $-1 < 0$ .

**Voie 2 :** Partant de la conjecture émise par les élèves qu'un négatif est inférieur à un positif, la question qui demeure est celle de sa preuve. Les élèves ayant déjà ordonné les entiers négatifs compris entre  $-10$  et  $-1$  et connaissant l'ordre sur les positifs de 1 à 10, la question devient : ***Que suffirait-il de prouver pour être certain que les négatifs sont tous inférieurs aux positifs ?***

Il y alors des chances que l'idée vienne de comparer  $-1$  à  $0$ . On revient alors à la technique par addition, par exemple de  $2$ , utilisée à la fin de la voie 1 :  $-1 + 2 = 1$  et  $0 + 2 = 2$ . Or  $1 < 2$ , donc  $-1 < 0$ .

**Etape 8 : Institutionnalisation : « un négatif est toujours inférieur à un positif » et conséquence sur l'ordre**

*Remarques :*

- *Tout ce qui précède repose sur l'extension postulée à  $\mathbf{Z}$  de la compatibilité de l'ordre avec l'addition dans  $\mathbf{N}$ . On l'étend ensuite à  $\mathbf{D}$ .*
- *Le professeur peut ou non faire écrire, selon son gré, des règles de comparaison des relatifs.*

**Un nombre négatif est toujours inférieur à un nombre positif.**

**Exemples :**

$-3 < 1$  ;  $7 > -10$  ;  $-0,0001 < 0$

**Conséquence :**

dès lors, on peut écrire :

$\dots < -7 < -6 < -5 < -4 < -3 < -2 < -1 < 0 < 1 < 2 < 3 < 4 < 5 < 6 < 7 < \dots$

ou encore :

$\dots < -10 < -9 < -8 < -7 < -6 < -5 < -4 < -3 < -2 < -1 < 0 < 1 < 2 < 3 < 4 < 5 < \dots$

**Etape 9 : travail de la technique et de l'organisation mathématique**

À ce moment du parcours, on peut commencer à faire travailler l'organisation mathématique et notamment, la technique de comparaison que l'on vient d'établir.

On donne donc des exercices de comparaison et de rangement par ordre croissant et décroissant. Par exemple des types suivants :

Comparer :  $-4,3$  et  $-5,1$  ;  $+6,40$  et  $+6,5$  ;  $-0,00007$  et  $-0,0008$  ;  $-4,8$  et  $+4,08$  ; etc.

Ranger dans l'ordre croissant :  $-6,2$  ;  $-41$  ;  $6$  ;  $+2,1$  ;  $-5$  ;  $+0,1$ .

Ranger dans l'ordre décroissant :  $-2,1$  ;  $-2,11$  ;  $2,001$  ;  $-2,01$  ;  $+2,02$  ;  $-2$ .

Après que les élèves sont parvenus à une certaine maîtrise des techniques de comparaison, devrait advenir une question dans la classe, en filigrane ou de manière explicite. Si ce n'est pas le cas, ou afin de la formaliser pour être comprise de tous si elle a été évoquée par un ou des élèves, le professeur pose la question :

***Question cruciale : on a vu en 6<sup>e</sup>, comment repérer un point sur une demi-droite. Est-il possible de repérer un point sur une droite ?***

On revient d'abord au tracé d'une demi-droite graduée sur laquelle on fait placer des points et déterminer leur abscisse et où, à partir d'une abscisse donnée, on place le point. C'est en principe une connaissance disponible :



**Question : comment faire pour graduer la demi-droite opposée ?**




Ainsi arrive la droite graduée... que les élèves tracent de  $-10$  à  $+10$ , par exemple, en utilisant les entiers.

Le professeur demande alors de placer des points dont l'abscisse est décimale non entière sur cette droite graduée, par exemple :  $4,5$  ;  $-3,4$  ;  $-3,6$  ;  $-4,5$  ;  $+7,1$  ;  $+7,5$  ; ...

**Question cruciale : pourrait-on calculer la distance entre deux points sur une droite graduée connaissant leurs abscisses, par exemple entre les points d'abscisses  $-4,5$  et  $+7,5$  quand on n'a pas la représentation des points sur la droite graduée ?**

On simplifie la question en commençant à travailler sur les points d'abscisses  $-4,5$  et  $+7,5$  qui viennent d'être placés sur une droite graduée :



Les élèves mesurent ou calculent et trouvent 12. Ils doivent justifier leur résultat par le calcul. Ils disent que l'on a ajouté  $4,5$  à  $7,5$ , c'est-à-dire les valeurs absolues des abscisses.

C'est l'occasion d'identifier la valeur absolue à la **distance d'un point d'abscisse donnée d'une droite graduée à son origine**, soit ce que des programmes ont désigné sous l'appellation... « distance à zéro ».

On en déduit, à partir d'autres exemples, que dans le cas où les abscisses des points sont de signes contraires, alors on ajoute leurs valeurs absolues.

**Question : Peut-on faire de même pour des points ayant d'autres abscisses, par exemple d'abscisses  $4,5$  et  $7,5$  ?**



Les élèves font de même : mesure ou calcul. On demande de nouveau une justification par le calcul et les élèves répondent  $7,5 - 4,5$  ou  $7,5 - (+4,5)$ .

On en déduit, à partir d'autres exemples, que dans le cas où les abscisses des points sont positives, alors on soustrait leurs valeurs absolues.

**Question : quel est le cas restant à examiner ?**

Les élèves proposent le cas où les deux abscisses sont négatives, par exemple,  $-4,5$  et  $-3,4$



Les élèves font de même : mesure ou calcul. On demande de nouveau une justification par le calcul et les élèves répondent  $4,5 - 3,4$ .

On en reste en ce point tout en regrettant que n'existe pas une relation unique pour tous les cas, mais qu'il faille distinguer entre l'addition et la soustraction selon que les abscisses sont de signes contraires ou de mêmes signes.

### **Etape 10 : travail des techniques de calcul de la distance de deux points sur une droite graduée**

*Remarque : une fois connue la technique de soustraction, il est possible de revenir sur la question d'une technique plus générale de calcul, en enseignant par ostension que le calcul de la distance de deux points revient à calculer la différence de leurs abscisses. Soit, comme l'écrivent les manuels, « la plus grande moins la plus petite » ou soit, plus simplement, la valeur absolue de la différence des abscisses, ce qui évite d'avoir au préalable à déterminer la plus grande des deux.*

## **Reprise de la recherche de possibilité d'opérations sur les relatifs : cas de la soustraction**

Une nouvelle question est amenée par le professeur : *Après l'addition et l'ordre, la soustraction est-elle une autre opération possible avec les relatifs ?*

Par exemple, en revenant aux questions restées ouvertes depuis l'étude de l'addition, peut-on calculer la différence de  $+7$  et  $+2$ , de  $+7$  et  $-2$ , de  $-7$  et  $-2$  ? On se souvient que l'on avait buté sur les calculs  $+7 - (-2)$  et  $-7 - (-2)$ .

Les élèves ont à écrire chaque différence avec le signe  $-$  de soustraction et à calculer le résultat. Le recours aux parenthèses ne doit plus poser de problèmes. On se lance de nouveau dans des tentatives de calcul :  $+7 - (+2)$  ;  $+7 - (-2)$  ;  $-7 - (-2)$  ;  $-7 - (+2)$ .

### **Etape 1 : technique, son explicitation et sa justification dans le cas de deux positifs et dans celui d'un positif soustrait à un négatif**

Certains de ces calculs, comme les suivants, ne posent pas de problème aux élèves qui s'y engagent :

$$+7 - (+2) = 7 - 2 = 5.$$

*On s'appuie pour cela sur l'identification de la soustraction des positifs à la soustraction dans  $\mathbb{N}$  quand celle-ci est possible.*

*Dans le cas où la valeur absolue du premier nombre est inférieure à celle du second, on recourt aux opérateurs :  $+2 - (+7) = +2 - 7$  : à un nombre on ajoute 2 puis retranche 7, ce qui revient à lui soustraire 5, noté  $-5$ .*

De même, une justification analogue permet d'écrire :  $-7 - (+2) = -7 - 2 = -9$ .

### **Etape 2 : recherche d'une technique et de sa justification dans le cas de deux négatifs et dans celui d'un négatif soustrait à un positif**

Le problème est plus délicat pour les calculs de  $+7 - (-2)$  et  $-7 - (-2)$ . On peut attendre des propositions d'élèves, mais à ce stade, il paraît difficile qu'ils puissent les justifier à partir des connaissances dont ils disposent.

### 1<sup>re</sup> voie :

Néanmoins, nous avons pu observer un élève qui a raisonné ainsi :

«  $+7 - (+2) = 7 - 2 = 5$ , donc  $-7 - (-2)$ , qui est son opposé (car il suffit de calculer la somme des deux nombres  $+7 - (+2)$  et  $-7 - (-2)$  pour s'apercevoir qu'elle est nulle), est égal à  $-5$ .

Il en est de même pour  $-7 - (+2)$  et  $7 - (-2)$  qui sont opposés.

Comme on sait que  $-7 - (+2) = -7 - 2 = -9$ , il en résulte que  $7 - (-2) = 9$  »

### 2<sup>e</sup> voie :

Apparaît, dans certaines classes, l'idée de revenir à des soustractions que l'on sait faire en ajoutant le même nombre aux deux termes de la différence. Cette idée émerge évidemment de la technique élaborée pour parvenir à comparer deux négatifs. C'est aussi une justification didactique de la proximité temporelle que nous avons choisie entre ordre, tout d'abord puis soustraction, dans ce PER<sup>7</sup>.

Ainsi, des élèves proposent-ils, en acte, de s'appuyer sur la régularité de tout élément pour l'addition dans  $\mathbf{Z}$ , en évoquant le fait que l'écart ne change pas si l'on ajoute le même nombre aux deux termes de la différence.

Par exemple :  $+7 - (-2) = [+7 + \mathbf{5}] - [(-2) + \mathbf{5}] = 12 - (+3) = 12 - 3 = 9$

et  $-7 - (-2) = [-7 + \mathbf{10}] - [(-2) + \mathbf{10}] = 3 - (+8) = 3 - 8 = -5$

Cette technique, judicieuse, est ensuite travaillée pour d'autres valeurs des nombres. On peut vérifier sa validité dans les cas où l'on savait calculer la différence : deux positifs, et un positif soustrait à un négatif.

La difficulté apparaît lorsqu'on souhaite la transformer en une technique plus simple : l'addition au premier nombre de l'opposé du second.

### 3<sup>e</sup> voie :

Des élèves, souvent, tentent de décomposer additivement le premier nombre, comme cela avait été fait lorsqu'on cherchait des techniques de calcul des sommes. Le problème qui surgit et que l'on va retrouver dans la 4<sup>e</sup> voie, tient, par exemple sur les calculs  $7 - (-2)$  et  $-7 - (-2)$ , à ce qu'il faut faire apparaître le nombre  $-2$  à partir de  $7$  et de  $-7$ .

Donc décomposer :

$7 = 9 - 2 = 9 + (-2)$  et  $-7 = -5 - 2 = -5 + (-2)$ . La décomposition est effectivement « additive », mais en utilisant l'addition, non plus dans  $\mathbf{N}$ , mais dans  $\mathbf{Z}$ .

Il est donc nécessaire de laisser les élèves chercher pour s'engager dans diverses tentatives, puis proposer des réponses.

Une solution consiste à laisser vivre la 2<sup>e</sup> voie qui permet d'obtenir le calcul de la différence, et s'appuyer sur les résultats obtenus qui donnent le nombre ( $9$  et  $-5$  dans ces exemples) à utiliser pour obtenir les décompositions additives recherchées.

On a ainsi :  $+7 - (-2) = 9 + (-2) - (-2) = 9 + 0 = 9$  et  $-7 - (-2) = -5 + (-2) - (-2) = -5 + 0 = -5$

---

<sup>7</sup> Cette proximité n'est pas fortuite si l'on se réfère à l'organisation mathématique. En effet, on peut définir la relation d'ordre  $\leq$  dans  $\mathbf{Z}$  de la manière suivante :  $n \leq m \Leftrightarrow n + \text{opp.}(m) \in \mathbf{Z}$ .

#### 4<sup>e</sup> voie :

Si on a choisi de faire intervenir 0 pour l'établissement du calcul des sommes, les élèves essaient cette technique, comme cela a été fait avec l'addition, en introduisant des sommes du type  $2 - 2$  dans le calcul, mais cela n'aboutit pas.

En examinant ces deux calculs qui posent problème, le professeur peut faire mettre en évidence leur différence de nature par rapport à ceux qui précèdent ; ce qui amène à la question suivante : **Comment faire pour calculer la différence d'un nombre relatif, qu'il soit positif ou négatif, avec un autre qui est négatif ?**

Deux possibilités peuvent advenir à partir du moment où les élèves sont conscients du problème. Soit ils se souviennent que face à une difficulté comme celle-ci, rencontrées deux fois pour l'addition, on a introduit le nombre 0 dans le calcul, mais ne parviennent pas à mener à bien l'utilisation de cette idée. Soit ils ne l'évoquent pas et c'est le professeur qui les guide vers la technique déjà utilisée pour résoudre le problème, lors de la recherche du principe du calcul de la somme, en la leur rappelant.

Quelle que soit l'éventualité, la question qui vient ensuite est celle de la fonctionnalité du 0 : **à quoi cela sert-il d'introduire 0 dans le calcul, par exemple dans le calcul de  $7 - (-2)$  ? Ou encore, 0 va être sans doute remplacé par une somme, laquelle et pourquoi celle-là ?** C'est donc vers un élargissement de la place des élèves dans la construction de la réponse que l'on se dirige désormais.

La réponse attendue des élèves voudrait que l'on se serve de l'opposé de -2 ; par exemple, que l'on écrive  $0 = -2 + (+2)$ . Il s'agit de faire discuter les élèves sur le choix le plus judicieux pour arriver à mener à bien le calcul de  $+7 - (-2)$  par exemple. La réponse consiste à dire qu'insérer 0 va servir à calculer avec -2, donc qu'il va falloir utiliser la somme de -2 et de son opposé ; il va donc falloir discuter pour choisir entre l'écriture  $-2 + (+2)$  ou bien l'écriture  $2 + (-2)$ .

Une question surgit encore. Si on écrit par exemple,  $+7 - (-2) = +7 - 0 - (-2)$ , écriture la plus probable en tenant compte des écritures utilisées avec les additions, **comment faire pour remplacer 0 par la somme adéquate, sachant qu'il y a un signe « - » devant 0 et comment calculer ensuite ?** La réponse consiste à dire que l'on n'est pas obligé de soustraire 0, puisque l'ajouter ne change rien. On préférera donc l'ajouter. C'est soit une réponse qui apparaît dans la classe, soit que le professeur donne. Il reste donc la question de savoir si on ajoute  $-2 + (+2)$  ou bien  $2 + (-2)$ .

Si on choisit d'écrire :  $+7 - (-2) = +7 - 2 + (+2) - (-2)$ , la seule possibilité de continuer la simplification est d'écrire  $+7 - 2 + (+2) - (-2) = +7 + (+2) - 2 - (-2)$  en commutant -2 et +2. Le professeur doit accompagner ce passage, non trivial, puis accompagner peut-être celui qui consiste à dire que, **si à -2 on soustrait -2, on obtient 0.**

Si on choisit d'écrire :  $+7 - (-2) = 7 + 2 + (-2) - (-2)$ , le seul point délicat, méritant peut-être un accompagnement par le professeur, est celui qui consiste à dire que, **si à -2 on soustrait -2, on obtient 0.**

Une autre technique consiste à ajouter 0 en tant que dernier terme de la somme :

$$\begin{aligned} &+7 - (-2) \\ &= 7 - (-2) + 0 \\ &= 7 - (-2) + (-2) + (+2) \end{aligned}$$

$$= 7 + 0 + 2 \text{ (car on soustrait } -2 \text{ puis on ajoute } -2)$$

$$= 9$$

C'est, ici encore, un passage délicat et il y a de fortes chances que ce soit le professeur qui l'indique : car il faut à la fois que le regard se déplace du bloc des deux derniers termes vers celui constitué du second et du troisième, et que l'on accepte que **soustraire d'abord puis ajouter ensuite le même nombre donne 0** (alors que traditionnellement, on ajoute d'abord, puis on soustrait). Lors de cette phase, la place des élèves risque d'être de nouveau réduite, le professeur reprenant la main. Néanmoins la place des élèves s'est élargie par rapport à ce qu'elle était au moment de l'addition. Elle s'élargira encore lors du calcul suivant de  $-7 - (-2)$ , puisque les élèves pourront s'appuyer sur la technique d'introduction de 0 qui a été rencontrée trois fois déjà.

On a donc résolu le problème que l'on se posait dans un cas : celui du calcul de  $+7 - (-2)$ . C'est maintenant **aux élèves de le résoudre par eux-mêmes**, sans l'aide du professeur, dans le deuxième cas, celui du calcul de  $-7 - (-2)$  ; le professeur pouvant seulement indiquer que l'on utilisera la même technique.

De même :

$$-7 - (-2)$$

$$= -7 - (-2) + 0$$

$$= -7 - (-2) + (-2) + (+2)$$

$$= -7 + 0 + 2 \text{ (car on soustrait } -2 \text{ puis on ajoute } -2)$$

Donc :

$$-7 - (-2)$$

$$= -7 + 2$$

$$= -5$$

Quelle que soit la voie choisie, il est nécessaire de faire éprouver par les élèves la technique qui a été trouvée. Aussi, les élèves continuent-ils seuls à utiliser cette technique dans d'autres calculs qu'on leur demande de trouver :

$10 - (-15) =$	$-3 - (-9) =$	$-4 - (+9) =$
$-9 - (-3) =$	$8 - (-5) =$	$5,3 - (-5,12) =$
$-5 - (+8) =$	$-15 - (+10) =$	$9 - (-4) =$

La fonction de cet exercice est encore, parmi celle d'entraînement, de montrer que l'on a intérêt à trouver une technique plus économique que celle du passage par 0, de montrer aussi la non commutativité de la soustraction. C'est alors au **professeur d'énoncer la règle qui apparaît et qui consiste à ajouter au premier nombre l'opposé de second**.

*On peut évidemment la justifier en utilisant le fait que tout élément est régulier pour l'addition dans  $\mathbf{Z}$  ; encore faut-il le savoir !*

*On développera ce point dans le PER sur les équations en 4<sup>e</sup> à partir de la définition de l'égalité :  $a = b \Leftrightarrow a - b = 0 \Leftrightarrow a + c - b - c = 0 \Leftrightarrow a + c - (b + c) = 0 \Leftrightarrow a + c = b + c$*

*On peut être tenté de se servir de cela en pariant sur une connaissance en acte disponible chez les élèves. Cela suppose de revenir à la définition de la différence de deux nombres, et aussi, comme la soustraction n'est pas commutative, de ne pas se tromper dans l'ordre d'écrire :  $a + d = b$  signifie que  $d$  est la différence  $b - a$ .*

Or, pour les élèves, transformer  $7 - (-2)$  en faisant apparaître une somme, risque d'être écrit, en suivant le sens de la lecture de gauche à droite :  $7 + d = -2$  au lieu de  $-2 + d = 7$  !  
Nous n'avons donc pas fait le choix de suivre cette voie pourtant mathématiquement correcte.

On consigne dans le cahier de cours :

### 3. La soustraction des nombres relatifs

**Définition :** Etant donnés deux nombres relatifs, on peut toujours calculer leur *différence* qui est un nombre relatif. L'opération qui, à deux relatifs, associe leur différence s'appelle *la soustraction des relatifs*.

#### Règle de calcul de la différence de deux relatifs

Pour calculer la différence de deux relatifs, on ajoute au premier l'opposé du second.

*Ou encore, selon la formulation de certains programmes : pour soustraire un nombre relatif, on ajoute son opposé.*

#### Exemples :

$$10 - (-15) = 10 + 15 ; -9 - (-3) = -9 + 3 ; -3 - (-9) = -3 + 9 ; 8 - (-5) = 8 + 5.$$

$$+7 - (+2) = 7 - 2 = 7 + (-2) ; -5 - (+3) = -5 - 3 = -5 + (-3)$$

#### Deux remarques importantes

$$10 - (-15) = 25 \text{ et } -15 - 10 = -25 ; \text{ la soustraction n'est pas commutative}$$

$$9 - 11 = -2 ; \text{ la soustraction est toujours possible}$$

De la dernière des remarques naît une question : *Pourquoi la soustraction n'était-elle pas toujours possible lorsqu'on ne connaissait pas les relatifs ? Dans quels cas cela se produisait-il ?*

La réponse attendue des élèves est que si le nombre à soustraire était plus grand que le premier nombre, la soustraction était impossible. Ce qu'on note : « Si  $a > b$  alors on ne pouvait pas calculer  $b - a$  », par exemple en l'exemplifiant dans de nombreux cas que l'on peut demander aux élèves de proposer :  $9 - 11$  ;  $5 - 8$  ; etc.

#### **Question cruciale : Et maintenant, pourquoi la soustraction est-elle possible dans ces cas ?**

Le test sur les exemples précédents aboutit à écrire des résultats du type :

$$3 < 5 \text{ alors } 5 - 3 = 2 \text{ positif}$$

$$4 > 2 \text{ alors } 2 - 4 = -2 \text{ négatif}$$

Les élèves peuvent se convaincre de ces résultats en complétant le tableau suivant, ce qui leur les conduit aussi dans un moment de travail de la technique du calcul de différences :

$a$	$b$	$b-a$	$a < b$ ou $a > b$
+0,1	+0,15		
+7	+6,3		
-5	+3,2		
-3	-5,8		
+11,45	-10		
-0,75	-0,5		

On conclut alors que :

**Etant donnés deux nombres relatifs  $a$  et  $b$  :**

- Si  $a < b$  alors  $a - b$  est négatif

- Si  $a > b$  alors  $a - b$  est positif

### Exercices A PROPOSER

Parmi les exercices d'entraînement sur la différence, un certain type d'exercices est intéressant afin d'aller vers la résolution des équations que l'on rencontre à travers la recherche de la différence de deux nombres. Ce type d'exercices facilite ensuite la mise en place de techniques permettant la résolution d'équations (la transposition).

**Exercice :** Par définition, la différence  $d$  de deux nombres est le nombre qu'il faut ajouter au premier pour obtenir le second. Cette définition, rencontrée pour les entiers et les décimaux positifs, reste vraie pour les relatifs.

Ainsi, la différence  $d$  de  $-5,4$  et  $+2,1$  est définie par :  $-5,4 + d = +2,1$ , donc  $d = +2,1 - (-5,4)$ .

Dans l'écriture  $d + (-4,8) = -0,4$ ,  $d$  est la différence de  $-4,8$  et  $-0,4$ , donc  $d = -0,4 - (+4,8)$ .

Déterminer les valeurs de  $d$  dans les différents cas suivants :

$6,3 + d = 2,9$  ;  $d + (-1,7) = -2,4$  ;  $-5,3 = d + (-2,8)$  ;  $d + 3,26 = 2,14$  ;  $0,0101 + d = 1,101$  ; etc.

## Cinquième séquence

### Etablir les règles de calcul du produit de relatifs

Durée : entre 6 et 8 séances de 55 min

On décide de se placer immédiatement dans **D**. En effet, dans **Z**, la première rencontre avec le calcul d'un produit du type « un positif fois un négatif »,  $n \times (-m)$  avec  $n$  et  $m$  entiers naturels, peut déboucher sur la technique recourant à la somme suivante :  $\underbrace{(-m) + (-m) + \dots + (-m)}_{n \text{ termes}}$ . C'est-

à-dire sur l'extension à **Z** d'une définition de la multiplication dans **N** qui s'appuie sur l'addition itérée, tel que cela a pu être enseigné aux élèves à l'école élémentaire. Ce ne serait pas un problème si cela ne le devenait au plan didactique, et donc au niveau des apprentissages, dans la mesure où cette définition n'est guère opératoire que dans **N** et où elle retarde le recours à la distributivité. On sait en effet qu'elle se constitue souvent en obstacle didactique lorsqu'il faut enseigner le produit de deux décimaux. Dans ce cas, il devient difficile de faire vivre la multiplication de deux décimaux comme une addition itérée, sauf à recourir à des multiplications et divisions par des puissances de 10 afin de commencer par transformer le produit à calculer en produit d'entiers, puis à revenir à une écriture non entière du produit recherché. L'usage de la définition initiale basée sur l'addition devient impossible lorsqu'il s'agit du produit de deux irrationnels comme, par exemple au niveau du Collège, des produits du type  $\sqrt{2} \times \sqrt{3}$ . Autant donc éviter de faire revivre chez les élèves, dès la rencontre avec l'étude du produit de relatifs, ce qui favorise un retour vers cet obstacle. Autre problème didactique : si l'on suit la voie qui fait rencontrer la multiplication comme addition itérée, alors le recours à l'extension de la distributivité de **N** à **Z** n'intervient qu'au moment de la détermination du produit de deux entiers négatifs, et elle se repose de nouveau pour chacun des cas concernant la règle des signes pour des décimaux relatifs ; sauf à faire admettre par les élèves son extension aux décimaux... Or, il est possible d'éviter ces difficultés.

Aussi, les considérations qui précèdent nous conduisent à décider de faire vivre immédiatement l'extension à **D** de la distributivité et de la commutativité de la multiplication dans  $\mathbf{D}_+ = \mathcal{D}$ , en engageant les élèves à rechercher comment enlever la problématique des calculs de produits dans **D**, et non pas, comme c'est souvent le cas des propositions des manuels, tout d'abord dans **Z**, puis ensuite dans **D**.

#### Etape 1 : Première rencontre avec la problématique du calcul du produit de deux relatifs et exploration du type de tâches relevant de cette problématique

##### 1<sup>re</sup> voie

Le choix de départ consiste à replonger les élèves dans des calculs sur les relatifs, au cours desquels on rencontre le produit d'un positif par un négatif comme problème que l'on aura à résoudre.

On propose donc, à titre de reprise de ce que l'on a appris sur les relatifs, des calculs du *type* des suivants, à effectuer mentalement, sans la calculatrice, à raison de quelques minutes en début d'heure, avant de passer à autre chose :

- Sommes algébriques :  $35 - 17$  ;  $23 - 48$  ;  $-5,4 + 9,2$  ;  $10,7 - 12,2$  ;
- Parenthèses et sommes d'opposés :  $-3 - (5 - 2)$  ;  $-3 + (5 - 2)$  ;  $(-1,1 - 2,2) - 3,3$  ;  
 $-1,1 - (2,2 - 3,3)$  ;  $1,5 + (7 - 8,5)$  ;  $(1,5 + 7) - 8,5$  ;  $(-1,6 - 0,8) + 2,4$  ;  $-1,6 - 0,8 + 2,4$
- Produits (comme on a, auparavant, calculé des sommes algébriques en respectant les priorités des parenthèses, il y a une forte probabilité pour que les élèves continuent dans les calculs suivants, d'autant que développer engage dans des calculs quasiment impossibles à mener « de tête ») :  $5,1 \times (-2,3 + 12,3)$  ;  $2 \times (-4,8 + 5,4)$  ;

$$(-6,5 + 9,5) \times 9,1 ; (8,4 + 1,6) \times (-11,2 + 15,4) ; (-1,8 + 7,8) \times 999.$$

## 2<sup>e</sup> voie

Il peut paraître étrange aux élèves de reprendre les calculs sur les relatifs qu'ils « connaissent » déjà ; les « révisions » ne sont guère appréciées et il a été montré depuis fort longtemps qu'elles sont de peu d'efficacité... Dans ce sens, emprunter la 1<sup>re</sup> voie peut apparaître comme une perte de temps, aussi bien pour les élèves que pour le professeur. Aussi peut-on directement engager les élèves dans la démarche suivante de laquelle émerge le problème, bien que les élèves ne l'identifient peut-être pas tout de suite ; ce sera alors au professeur de le leur montrer.

Il s'agit de proposer de calculer *mentalement* des produits du type des suivants :

$$5,1 \times (-2,3 + 12,3) ; 2 \times (-4,8 + 5,4) ; (-6,5 + 9,5) \times 9,1 ; (8,4 + 1,6) \times (-11,2 + 15,4) ; (-1,8 + 7,8) \times 999.$$

Ces calculs, qu'il est possible d'effectuer en tant que produits de nombres arithmétiques – ce que les élèves savent faire puisqu'il y a eu identification des positifs à leurs valeurs absolues – attirent leur attention sur la nécessité d'effectuer tout d'abord les sommes dans les parenthèses.

On passe alors au calcul :  $3,8 \times (4,7 - 14,7) = 3,8 \times (-10)$ .

Il est bien possible que certains élèves ne voient ni la nouveauté du calcul ni sa difficulté, d'autant qu'il s'agit d'un *calcul mental*, et qu'ils donnent immédiatement pour résultat -38 ou 38. C'est à ce moment *le rôle du professeur* que de demander la justification du résultat donné et d'indiquer que la classe est face à un nouveau problème, par comparaison avec les calculs précédents.

On passe alors à *l'écriture des calculs précédents* afin d'observer ce que l'on faisait. Ils se ramenaient tous au calcul du produit de deux décimaux positifs, qu'on a identifiés aux décimaux arithmétiques ; aussi les produits sont ceux que l'on sait calculer depuis les classes précédentes. Le produit  $3,8 \times (-10)$  est, quant à lui, d'un tout autre type.

Ce qui débouche sur la question : « *Comment calculer et justifier le produit de deux nombres relatifs (on peut aussi écrire 3,8 comme +3,8) ?* » Dans ce cas particulier : « *Comment trouver en le justifiant à quoi est égal le produit  $+3,8 \times (-10)$ , et plus généralement, comment calculer le produit d'un positif par un négatif ?* »

On est donc confronté à une question large  $Q$  : « *Comment calculer et justifier le produit de deux nombres relatifs ?* » C'est au professeur de faire travailler cette question par les élèves, de manière à ce qu'elle se décompose en  $Q_1$  : « *Comment calculer et justifier le produit d'un positif et d'un négatif ?* », en  $Q_2$  : « *Comment calculer et justifier le produit d'un négatif et d'un positif ?* » et en  $Q_3$  : « *Comment calculer et justifier le produit d'un négatif et d'un négatif ?* »

De telles questions sont à écrire au tableau, afin que chacun voie et puisse identifier le problème nouveau face auquel on se trouve et que l'on va travailler désormais.

Le champ des réponses données par les élèves est ouvert ; on les recueille. Il est possible que les réponses soient données « au hasard », « à l'intuition », et sûrement sans aucune justification mathématique. C'est donc *au professeur qu'incombe alors la nécessité* de replacer les élèves dans le cadre d'où a émergé le problème : calculer  $3,8 \times (4,7 - 14,7)$ .

Une nouvelle question apparaît. ***Q\**** : « *peut-on inventer des exemples de calculs du type « un nombre à multiplier par une somme ou une différence », qui aboutiraient à écrire les produits d'un positif par un négatif, d'un négatif par un positif, de deux négatifs ?* »

Le recensement et le classement selon le type auquel appartiennent les exemples donnés sont notés au tableau ; on choisit alors d'étudier quelques exemples pour chacun de ces types. L'intérêt de ce travail réside dans la conservation de l'écriture sous forme du produit par une somme algébrique, par exemple  $3,8 \times (4,7 - 14,7)$ , qui évite d'être immédiatement confronté à des calculs du type  $3,8 \times (-10)$  à partir desquels s'est perdue, parce qu'elle n'est plus visible, l'idée de distribuer 3,8.

**Etape 2 : Recherche de la résolution du problème posé par le produit d'un positif et d'un négatif (ébauche d'une technique), question  $Q_1$ , et construction de l'environnement technologique**

On divise la classe en trois ou quatre groupes ; chacun des groupes s'engageant dans le calcul d'un exemple différent relevant du type « produit d'un positif par un négatif ».

**Attention ! Tous les produits des exemples doivent être du type  $m \times (n - p)$ , avec  $m, n$  et  $p$  décimaux arithmétiques et  $p > n$ , et non pas  $m \times [n + (-p)]$ , sous peine d'être confronté, après développement, au produit d'un positif par un négatif  $m \times (-p)$ , qu'on ne sait évidemment pas calculer, puisque c'est précisément l'objet de cette étape ; ce qui aboutirait à une impasse.**

On travaille par exemple sur  $3,8 \times (4,7 - 14,7)$ . Il est possible que les élèves soient bloqués et ne proposent aucune piste d'attaque du calcul. ***Le professeur peut alors rappeler*** la clause du contrat didactique qui veut que les seuls outils dont on dispose soient ceux que l'on connaît pour les avoir étudiés antérieurement. Quels sont ces outils ?

On attend que soient mentionnés l'addition, la soustraction et l'ordre sur les relatifs, ainsi que la distributivité de la multiplication sur la soustraction. ***Le professeur propose*** alors, dans ce cas, de se servir de ces outils à bon escient afin d'ôter la problématique de ce calcul.

On établit ainsi que  $3,8 \times (4,7 - 14,7) = 3,8 \times 4,7 - 3,8 \times 14,7 = 17,86 - 55,86 = -38$ , qui étend « en acte » à **D** la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition dans  $\mathcal{D}$ .

***Question*** : « *qu'a-t-on établi à l'issue de ce calcul ?* » On attend des élèves qu'ils disent que l'on vient d'établir par le calcul et le raisonnement que  $3,8 \times (-10) = +3,8 \times (-10) = -38$ .

Ce résultat est confirmé sur les deux ou trois autres exemples traités par les autres groupes d'élèves. ***On fait établir et énoncer par les élèves la règle de calcul*** : « le produit d'un positif par un négatif est le négatif qui a pour valeur absolue le produit des valeurs absolues ».

Ce qui permet de faire noter sur le cahier des élèves :

## Multiplication des relatifs

### I. Calcul du produit de deux relatifs

#### 1°/ Produit de deux positifs

Le produit de deux nombres positifs est le nombre positif qui a pour valeur absolue le produit des valeurs absolues de ces deux nombres

**Exemple :**  $(+12,4) \times (+10) = 12,4 \times 10 = 124 = +124$

#### 2°/ Produit d'un positif par un négatif

Le produit d'un nombre positif par un nombre négatif est le nombre négatif qui a pour valeur absolue le produit des valeurs absolues

**Exemples :**  $3,8 \times (-10) = -38$  ;  $+4 \times (-2,5) = -10$  ;  $0,01 \times (-12) = -0,12$  ...

En effet :  $3,8 \times (-10) = 3,8 \times (4,7 - 14,7) = 3,8 \times 4,7 - 3,8 \times 14,7 = 17,86 - 55,86 = -38$

$+4 \times (-2,5) = +4 \times (0 - 2,5) = 4 \times 0 - 4 \times 2,5 = 0 - 10 = -10$

$0,01 \times (-12) = 0,01 \times (10 - 22) = 0,01 \times 10 - 0,01 \times 22 = 0,1 - 0,22 = -0,12$

...

**Remarque :** On peut donc inférer que ce résultat est général. « **Peut-on l'expliquer ?** » est une nouvelle question.

La réponse concernant le signe passe par la comparaison des produits obtenus lors des développements : « dans  $2,5 \times 0,1 - 2,5 \times 0,5$  comme  $0,1 < 0,5$ , alors  $2,5 \times 0,1 < 2,5 \times 0,5$  et  $2,5 \times 0,1 - 2,5 \times 0,5$  est négatif ».

On peut s'attendre à ce que les élèves recourent à ce type de raisonnements, même s'il n'est pas formulé de cette manière. La justification du fait que « la valeur absolue du produit est le produit des valeurs absolues » est plus délicate.

Par exemple, pour prouver ce résultat dans le cas de  $2,5 \times (-0,4)$ , on peut procéder ainsi : «  $2,5 \times 0,4 + 2,5 \times (-0,4) = 2,5 \times [0,4 + (-0,4)] = 2,5 \times 0 = 0$ .

Donc  $2,5 \times 0,4 + 2,5 \times (-0,4) = 0$  et donc  $2,5 \times (-0,4)$  est l'opposé de  $2,5 \times 0,4$  qui est le produit des valeurs absolues ».

On peut remarquer que calculer cette somme nulle donne directement le signe et la valeur absolue du produit d'un positif par un négatif ; et donc qu'on aurait pu engager tout de suite les élèves dans cette voie, ce qui nous aurait épargné toute la partie relative au développement des produits qui précède. S'il y a sans doute un avantage mathématique à cela, il y a aussi un handicap didactique. Car qui, parmi les élèves, peut avoir l'idée de calculer un produit nul pour obtenir le produit d'un positif et d'un négatif ?...

La méthode est très artificielle et il y a fort à craindre que la place laissée aux élèves soit très réduite. L'établissement de la réponse est alors toute entière confiée au professeur ; c'est exactement le contraire de ce qui est recherché ! Une telle « démonstration », que le professeur fera lui-même en sollicitant pour cela, dans le meilleur des cas, quelques élèves pour de banales tâches calculatoires, peut-elle entraîner-elle l'adhésion de la classe ?...

Des exercices suivent relatifs aux calculs de produits d'un positif par un négatif et que l'on effectue sans recourir au passage par la distributivité :  $2,5 \times (-0,4)$  ;  $0,1 \times (-2,5)$  ;  $10 \times (-0,2)$  ;  $+1,6 \times (-0,3)$  ;  $(+4) \times (-10,8)$  ;  $-2,3 \times 5,8$ .

**Etape 3 : poursuite de l'exploration des tâches problématiques sur les produits de deux relatifs, exploration des techniques et technologies**

1. Ce dernier calcul,  $-2,3 \times 5,8$ , est effectué par la plus grande partie des élèves sans remarquer qu'il est de nature différente des précédents. Si c'est le cas, **le professeur attire l'attention des élèves**, qui sont tentés d'affirmer la commutativité sans plus de façon, sur ce nouveau calcul. De nouveau, **le professeur insiste sur la nécessité** de l'établir et demande comment faire.

Pour trouver le produit d'un négatif par un positif, les élèves recourent de nouveau à la distributivité, à droite cette fois-ci, ou bien étendent la commutativité de la multiplication de  $\mathcal{D}$  à  $\mathbf{D}$ . On peut demander aux élèves de proposer de tels produits de deux décimaux relatifs.

Se mettant d'accord sur le calcul de  $-2,3 \times 5,8$ , les élèves commencent par décomposer 5,8 en somme ou différence et s'aperçoivent très vite que le problème ne peut être ainsi résolu. On en arrive alors à développer -2,3. L'écriture d'une différence de deux positifs apparaît comme une nécessité ; soit, par exemple,  $(2,7 - 5) \times 5,8$ .

On l'écrit :  $(2,7 - 5) \times 5,8 = 2,7 \times 5,8 - 5 \times 5,8$  expression dans laquelle on voit une différence de deux produits à calculer d'après les règles de priorité des opérations vues comme relevant tout d'abord de  $\mathcal{D}$ .

On obtient :  $2,7 \times 5,8 - 5 \times 5,8 = 15,66 - 29 = -13,34$ .

Il arrive que soit proposé  $(2,7 - 5) \times 5,8 = 5,8 \times 2,7 - 5,8 \times 5$ . En effet, certains élèves, s'appuyant sur la formulation orale « on distribue 5,8 », écrivent *ce qu'ils disent* et s'autorisent à ignorer la distributivité à droite. Le professeur doit les alerter sur ce fait et leur demander de rectifier.

**Remarque :** les élèves ayant étudié les relatifs dans la perspective d'un PER qui court au long du Collège, il est possible qu'apparaisse l'idée des programmes de calcul. Auquel cas, le produit  $-2,3 \times 5,8$  peut être interprété comme « à un nombre on soustrait le produit  $2,3 \times 5,8$ , donc on lui soustrait -13,34, donc  $-2,3 \times 5,8 = -13,34$  c'est-à-dire  $-(2,3 \times 5,8)$  ».

On partage de nouveau la classe en plusieurs groupes à qui on attribue la justification de calculs comme, par exemple :  $-9,2 \times (+10)$  ;  $-6,4 \times (+3,5)$  ;  $-0,3 \times 4$ . La classe est alors convaincue des résultats et **le professeur fait établir et énoncer par les élèves la règle de calcul** : « le produit d'un négatif par un positif est le négatif qui a pour valeur absolue le produit des valeurs absolues ».

Ce qui permet de faire noter sur le cahier des élèves :

### 3°/ Produit d'un négatif par un positif

Le produit d'un nombre négatif par un nombre positif est le nombre négatif qui a pour valeur absolue le produit des valeurs absolues

**Exemples :**  $-3,8 \times (+10) = -38$  ;  $-4 \times (+2,5) = -10$  ;  $-0,01 \times (+12) = -0,12$  ...

En effet :  $-3,8 \times (+10) = (4 - 7,8) \times 10 = 4 \times 10 - 7,8 \times 10 = 40 - 78 = -38$

$-4 \times (+2,5) = (1 - 5) \times 2,5 = 1 \times 2,5 - 5 \times 2,5 = 2,5 - 12,5 = -10$

$-0,01 \times (+12) = (1 - 1,01) \times 12 = 1 \times 12 - 1,01 \times 12 = 12 - 12,12 = -0,12$

...

**Remarque relative à l'explication :** Le signe du produit d'un négatif par un positif se justifie, comme toujours, par le fait qu'on soustrait à un décimal un décimal qui lui est plus grand. Pour justifier la valeur absolue, on peut :

- relancer les élèves dans un calcul de produit nul, en modifiant un peu ce qui porte sur le facteur nul ; par exemple :  $(-2,5 + 2,5) \times 0,4 = -2,5 \times 0,4 + 2,5 \times 0,4 = 0$ , donc  $-2,5 \times 0,4$  est l'opposé de  $2,5 \times 0,4$ , donc c'est  $-(2,5 \times 0,4)$ ,
- admettre que c'est évident, parce qu'on étend la commutativité de la multiplication dans  $\mathbf{D}$ ,
- revenir aux programmes de calcul (cf. supra).

**2. Nouvelle question : « Que faut-il étudier maintenant ? »** Il reste à examiner le cas du produit de deux négatifs.

Une voie mathématique rapide, mais dont on peut interroger la rapidité et l'efficacité au plan didactique, consiste à démontrer que multiplier un nombre par  $-1$  revient à trouver l'opposé de ce nombre. En effet,  $a$  étant un décimal relatif, on étend la distributivité à un cas particulier. On obtient ainsi le résultat suivant :

$$(-1) \times a + a = (-1) \times a + 1 \times a = (-1 + 1) \times a = 0 \times a = 0.$$

Comme  $(-1) \times a + a = 0$ , alors  $(-1) \times a$  est l'opposé de  $a$ . Par suite,  $m$  et  $n$  étant des entiers naturels, en étendant l'associativité de  $\times$  à  $\mathbf{D}$ , on a :

$$(-m) \times (-n) = [(-1) \times (m)] \times (-n) = (-1) \times [(m) \times (-n)] = (-1) \times (-m \times n) = m \times n.$$

Cela peut-il être transposé ? Comment amener les élèves à se poser ce genre de questions ? Il faudrait commencer par construire un milieu adéquat pour cela et, pour ce faire, demander par exemple le travail sur des expressions telles que :  $(-1) \times (-5) + (-5)$  ; cela après avoir posé la question « à quoi est égal le produit de deux négatifs ? » et avoir dit qu'on va la simplifier en se contentant, dans un premier temps, du produit d'un négatif par  $-1$ . Nous ne suivons pas cette voie.

Ainsi :

- On propose le calcul  $(-2,5) \times (-4)$  qui divise la classe quant au résultat : 10 ou -10 ? Ce qui confirme la nécessité d'une preuve : elle contiendra le résultat et sa justification. Certains élèves avancent qu'il serait surprenant que  $(-2,5) \times (-4)$  soit -10 car on sait que :  $-10 = (-2,5) \times 4$ .

Une telle remarque engage dans la voie qui consiste à rechercher si  $(-2,5) \times (-4)$  et  $(-2,5) \times 4$  sont opposés ; c'est-à-dire si leur somme est nulle. Ce qui donne, en étendant « en acte » la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition dans  $\mathcal{D}$  à  $\mathbf{D}$  :

$$\begin{aligned} (-2,5) \times (-4) + (-2,5) \times 4 &= (-2,5) \times [-4 + 4] \text{ (On utilise la distributivité pour factoriser)} \\ &= (-2,5) \times 0 = 0 \text{ (0 pouvant être considéré comme un nombre positif,} \\ &\quad \text{on se retrouve dans le cas du produit d'un négatif} \\ &\quad \text{par un positif que l'on sait résoudre)} \end{aligned}$$

On conclut alors que  $(-2,5) \times (-4)$  est l'opposé de  $(-2,5) \times 4 = -10$  ; donc  $(-2,5) \times (-4) = +10$

- Une deuxième voie consiste à revenir à la distributivité afin de développer judicieusement, ce dont les élèves ont désormais une certaine habitude, et en s'apercevant que dans ce cas, le produit ne peut pas être quelconque. Par exemple calculer le produit  $(-2,5) \times (-4)$  en décomposant ainsi  $(-2,5) \times [(-2) + (-2)]$  ou  $(-2,5) \times [(-6) + (+2)]$  ne permet pas de résoudre le problème ; on retrouve continuellement, quelle que soit la décomposition, le produit de deux négatifs. La question qui vient est alors la suivante :

**Question :** « *Comment décomposer judicieusement afin de ne plus obtenir le produit de deux négatifs ?* »

La solution réside dans le fait de recourir à la soustraction et non plus à l'addition.

Ainsi  $(-2,5) \times (-4) = (-2,5) \times [2 - (+6)]$  par exemple. On s'engage alors, en acte, dans l'extension de la distributivité de la multiplication par rapport à la soustraction de  $\mathcal{D}$  à  $\mathbf{D}$ .

On a :  $(-2,5) \times (-4) = (-2,5) \times [2 - (+6)] = (-2,5) \times 2 - (-2,5) \times (+6) = -5 - (-15) = 10$ .

On peut de nouveau diviser la classe en plusieurs groupes chargés de calculer, en les justifiant, des produits de deux négatifs :  $(-3,5) \times (-7,1)$ ,  $(-4) \times (-21)$ ,  $(-15) \times (-0,3)$ , etc. La classe est alors convaincue des résultats et **le professeur fait établir et énoncer par les élèves la règle de calcul** : « le produit d'un négatif par un négatif est le positif qui a pour valeur absolue le produit des valeurs absolues ».

Ce qui permet de faire noter sur le cahier des élèves :

#### **4°/ Produit d'un négatif par un négatif**

Le produit d'un nombre négatif par un nombre négatif est le nombre positif qui a pour valeur absolue le produit des valeurs absolues

**Exemples :**  $-3,8 \times (-10) = +38$  ;  $-4 \times (-2,5) = +10$  ;  $-0,01 \times (-12) = +0,12 \dots$

En effet :

$$-3,8 \times (-10) = (4 - 7,8) \times (-10) = 4 \times (-10) - 7,8 \times (-1) = -40 - (-78) = -40 + 78 = +78$$

$$-4 \times (-2,5) = (1 - 5) \times (-2,5) = 1 \times (-2,5) - 5 \times (-2,5) = -2,5 - (-12,5) = -2,5 + 12,5 = +10$$

$$-0,01 \times (-12) = (1 - 1,01) \times (-12) = 1 \times (-12) - 1,01 \times (-12) = -12 - (-12,12) = -12 + 12,12 = +0,12$$

**Remarque :** *L'idée de la justification du signe est moins naturelle que précédemment. La justification du signe et de la valeur absolue ne peut guère être trouvée que dans le retour à la distributivité associée au produit nul.*

#### **5°/ Conclusion de ce travail**

On vient de définir une nouvelle opération sur les nombres relatifs, la multiplication.

Les élèves devraient alors se demander s'il existe une quatrième opération : la division. Cela permet de relancer l'étude du PER, avec cette fois l'étude des fractions ou encore la résolution de l'équation  $a \times x = b$ , avec  $a$  et  $b$  décimaux relatifs, ou pour commencer,  $a$  et  $b$  entiers relatifs. Cette question reste provisoirement en suspens et sera étudiée plus tard, lorsqu'on se sera familiarisé avec le calcul des produits.

#### **Etape 4 : Travail de la technique et de l'organisation mathématique construite autour de la multiplication des relatifs**

Arrivé en ce point, il est nécessaire de donner de nombreux exercices de calcul du produit de deux relatifs, travaillant les différents cas possibles. Il semble aussi nécessaire de rencontrer des cas où l'un des facteurs est -1 ou 0. Les derniers calculs de produits doivent déboucher sur des produits de plusieurs facteurs, éventuellement répétés si l'on souhaite poursuivre par l'enseignement des puissances.

Par exemple, on peut avoir des calculs du type :

$(-1) \times 3$  ;  $(-1) \times (-3)$  ;  $(-5) \times (-1)$  ;  $(-4) \times (-7) \times (+3)$  ;  $(-4) \times (-7) \times x$  ;  $(-1) \times (-4) \times (-7) \times x$  ;  
 $(-1) \times 3x$  ; etc. De manière à établir le rôle du produit par -1, l'associativité de la multiplication, la détermination du signe du produit de plusieurs facteurs. Cela reste à travailler...

## ANNEXE 1


Les mathématiciens, parmi les plus grands, ont essayé de donner des justifications à la règle des signes du produit de deux nombres relatifs. Leurs explications sont variables, selon les auteurs et les publics auxquels ils s'adressent :

*Celle de Stevin (1625) :*

*Il s'agit en fait de comparer les aires des rectangles en les prenant globalement, puis en ajoutant les différentes petites parties, et d'arriver, en développant*

*(a - b) (c - d) où a, b, c, d sont des réels positifs à la nécessité d'écrire que (- b) x (- d) = bd.*

*Le calcul sur des grandeurs quelconques se fait, à l'époque de Stevin et depuis Euclide, en les représentant par des longueurs. L'explication conduit Stevin à donner des valeurs numériques aux grandeurs, pour « faire exemple ».*



*Celles de Mac Laurin, (1748) :*

*On pourrait de là déduire la règle des signes telle qu'on a coutume de l'énoncer, qui est que les signes semblables dans les termes du multiplicateur et du multiplicande donnent + au produit, et les signes différents donnent -. Nous avons évité cette manière de présenter la règle, pour épargner aux commençants l'expression révoltante - par - donne +, qui est cependant une conséquence nécessaire de la règle. : on peut, comme nous avons fait, la déguiser, mais non la contredire ou l'anéantir ; le lecteur, sans s'en apercevoir, en a observé tout le sens dans les exemples précédents ; familiarisé avec la chose, pourrait-il encore s'effaroucher des mots ? S'il lui reste là-dessus quelque scrupule, qu'il fasse attention à la démonstration suivante qui attaque directement la difficulté. + a - a = 0, ainsi par quelque quantité qu'on multiplie + a - a, le produit doit être 0 : si je le multiplie par n, j'aurai pour le premier terme + na, donc j'aurai pour le second - na, puisqu'il faut que les deux termes se détruisent. Donc les signes différents donnent - au produit ? Si je multiplie + a - a par - n, par le cas précédent, j'aurai - na pour le premier terme ; donc j'aurai + na pour le second, puisqu'il faut toujours que les deux termes se détruisent : donc - multiplié par - donne + au produit.*

La « règle des signes » énoncée par Stevin : « moins multiplié par moins donne produit plus » est ici aussi énoncée. Elle semble être la forme mnémotechnique culturellement reconnue qui pourtant est dite « une expression révoltante » pour les commençants, parce qu'elle est « la règle des signes » venue d'une interprétation de l'écriture  $-a$  comme «  $a$  (naturellement positif) précédé d'un signe ». Mais elle n'est plus écrite en langue naturelle : elle est devenue composition des symboles.

***Celle de Euler, (1770) :***

*Il nous reste à résoudre encore ce cas où – est multiplié par – ou, par exemple – a par – b. Il est évident d'abord que quant aux lettres, le produit sera ab ; mais il est incertain encore si c'est le signe + ou bien le signe – qu'il faut mettre devant ce produit ; tout ce qu'on sait, c'est que ce sera l'un ou l'autre de ces signes. Or je dis que ce ne peut être le signe–; car – a par + b donne – ab et – a par – b ne peut produire le même résultat que – a par + b ; mais il doit en résulter l'opposé, (du résultat –ab) c'est à dire + ab ; par conséquent nous avons cette règle : + multiplié par + fait +, de même que – multiplié par –.*

Nous comprenons bien qu'il s'agit de la règle des signes, puisqu'il n'y a en fait que des quantités négatives, désignées par un nombre positif, et précédé du signe -. Mais si l'auteur ne nomme pas les « nombres négatifs », il nomme *l'opposé* d'un nombre et peut asseoir son raisonnement sur ce commencement de jeu de langage.

***Celle de Cauchy (1821) :***

*D'après ces conventions, si l'on représente par A soit un nombre, soit une quantité quelconque, et que l'on fasse  $a = +A$ ,  $b = -A$  On aura :  $+a = +A$ ,  $+b = -A$ ,  $-a = -A$ ,  $-b = +A$  Si dans les quatre dernières équations l'on remet pour a et b leurs valeurs entre parenthèses, on obtiendra les formules :  $+(+A) = +A$  ;  $+(-A) = -A$  ;  $-(+A) = -A$  ;  $-(-A) = +A$  Dans chacune de ces formules le signe du second membre est ce qu'on appelle le produit des deux signes du premier. Multiplier deux signes l'un par l'autre c'est former leur produit. L'inspection seule des équations suffit pour établir la règle des signes.*

Comme on le voit, l'auteur joue en algébriste sur les symboles,  $-A$  désignant l'opposé de  $A$  et étant lui même noté  $a$  (c'est nouveau : la lettre  $a$  dénote ici un opposé qui donc peut-être « un négatif » comme nous disons), alors  $-a = -(-A) = +A = A$ . Le jeu de langage se poursuit en jeu de notations, dans une dialectique connue.

***Celle de Hankel (1867) :***

Son explication peut se résumer par un calcul qui, fondé sur une axiomatique, démontre la propriété sans autre forme de discours : le jeu de langage est algébrisé, il obéit dorénavant à une logique calculable, mais... a disparu ce qui va poser problème au professeur !

$$0 = a \times 0 = a \times (b + opp\ b) = ab + a \times (opp\ b)$$

$$0 = 0 \times (opp\ b) = (a + opp\ a) \times (opp\ b) = a \times (opp\ b) + (opp\ a \times opp\ b)$$


$$donc\ (opp\ a) \times (opp\ b) = ab.$$

Dans cette perspective, les négatifs ont le statut de nombre et Hankel distingue alors de façon nette le signe opératoire « $\rightarrow$ » du signe « opp » qui dénote l'opposé. La règle est devenue « règle de multiplication des opposés » et c'est dorénavant ce jeu de langage là qui, seul, rend compte du travail algébrique. La règle des signes n'a en principe plus droit de cité. En fait, le bouleversement apporté par Hankel s'inscrit dans la rupture de la pensée mathématique de la fin du XIX<sup>e</sup> siècle à propos des relations entre les mathématiques et la réalité physique. Jusque là, si l'on inventait de nouveaux « nombres » qui choquaient les idées reçues, ils étaient automatiquement qualifiés de incompréhensibles, inconcevables, absurdes, sourds, irrationnels, faux, imaginaires, ou même, négatifs. Hankel accepte que  $(-3)^2 > (2)^2$ , car ce résultat est cohérent, et il écrit ainsi :

*« Le nombre n'est plus aujourd'hui une chose, une substance qui existerait en toute indépendance en dehors du sujet pensant ou des objets qui en sont l'occasion ; ce n'est plus un principe indépendant comme l'ont cru les pythagoriciens. La question de l'existence des nombres nous renvoie soit au sujet pensant, soit aux objets pensés dont les nombres présentent des relations. Le mathématicien tient pour impossible au sens strict cela seul qui est logiquement impossible, c'est-à-dire qui implique une contradiction. Il n'est pas besoin de démontrer qu'on peut admettre des nombres impossibles en ce sens. Mais si les nombres considérés sont logiquement possibles, si leur concept est défini clairement et distinctement, s'il est donc libre de toute contradiction, la question ne peut plus être de savoir s'il y a dans le domaine du réel, dans ce qui est intuitif ou actuellement donné, un substrat pour ce nombre, s'il existe des objets qui puissent donner matière aux nombres en tant qu'ils sont relations intellectuelles d'un certain type ».* « Théorie du système des nombres complexes », H. Hankel, 1867.

Revenant à une problématique d'apprentissage, voici ce qu'écrivait par exemple l'écrivain français Stendhal, dans son roman autobiographique *La vie d'Henri Brulard*, en 1835, pour exprimer son désarroi face à une interprétation mal présentée de la règle des signes (d'après Anne Boyé, IREM, Nantes) :

*Mon grand malheur était cette figure :*



*Supposons que RP soit la ligne qui sépare le positif du négatif, tout ce qui est au-dessus est positif, comme négatif tout ce qui est au-dessous ; comment, en prenant le carré B autant de fois qu'il y a d'unités dans le carré A, puis-je parvenir à faire changer de côté au carré C ?*

*Et, en suivant une comparaison gauche que l'accent souverainement traînard et grenoblois de M. Chabert rendait encore plus gauche, supposons que les quantités négatives sont les dettes d'un homme, comment en multipliant 10 000 francs de dette par 500 francs, cet homme aura-t-il ou parviendra-t-il à avoir une fortune de 5 000 000, cinq millions de francs ?*

Alain Mercier

## ANNEXE 2

### Un arrière-plan mathématique pour les relatifs vus comme programmes de calcul ; quelques éléments sur la transposition didactique

#### La construction « classique » de $(\mathbf{Z}; +)$

Sur  $\mathbf{N}$ , on a défini une opération interne  $+$  qui est associative, commutative et pour laquelle tout entier naturel  $n$  est régulier, c'est-à-dire :  $x + n = y + n \Leftrightarrow x = y$ .

On définit ensuite une relation d'ordre sur  $\mathbf{N}$  par :  $\forall x \text{ et } y \in \mathbf{N} : x \leq y \Leftrightarrow \exists d \in \mathbf{N} / y = x + d$   
On démontre que cette relation est une relation d'ordre total sur  $\mathbf{N}$  et qu'elle est compatible avec l'addition, c'est-à-dire que :  $\forall x, y \text{ et } n \in \mathbf{N} : x + n \leq y + n \Leftrightarrow x \leq y$

On définit la différence sur  $\mathbf{N}$ , par  $d = y - x \Leftrightarrow x + d = y$  ;  $d$  est alors défini de manière unique. En effet, si  $d$  et  $d'$  désignent la différence entre  $x$  et  $y$  avec  $x \leq y$ , alors on peut écrire que :  $y = x + d = x + d'$ . Or, tout entier  $x$  étant régulier pour l'addition, alors  $d = d'$

***Ce résultat nous servira dans la transposition didactique qui suit et qui est basée sur les programmes de calcul.***

On considère sur  $\mathbf{N} \times \mathbf{N}$  la relation  $\mathcal{R}$  définie par  $(x, y) \mathcal{R} (x', y') \Leftrightarrow x + y' = x' + y$ . Cette relation est une relation d'équivalence sur  $\mathbf{N} \times \mathbf{N}$  :

- elle est réflexive puisque  $x + y = x + y$  et donc, quel que soit  $(x, y)$  : on a  $(x, y) \mathcal{R} (x, y)$
- elle est symétrique puisque si  $x + y' = x' + y$ , alors  $x' + y = x + y'$ , donc, quel que soit  $(x, y)$  et  $(x', y')$  : si  $(x, y) \mathcal{R} (x', y')$  alors  $(x', y') \mathcal{R} (x, y)$
- elle est transitive car si  $x + y' = x' + y$  et si  $x' + y'' = x'' + y'$  alors  $(x + y') + (x' + y'') = (x' + y) + (x'' + y')$ , donc d'après l'associativité et la commutativité de  $+$  dans  $\mathbf{N}$  :  $(x + y'') + (x' + y') = (x'' + y) + (x' + y')$ , et comme tout élément de  $\mathbf{N}$  est régulier pour l'addition alors, en simplifiant par  $(x' + y')$ , on obtient  $x + y'' = x'' + y$  ; donc quel que soit  $(x, y)$ ,  $(x', y')$  et  $(x'', y'')$  : si  $(x, y) \mathcal{R} (x', y')$  et si  $(x', y') \mathcal{R} (x'', y'')$  alors  $(x, y) \mathcal{R} (x'', y'')$ .

Un nombre relatif est une classe d'équivalence de  $\mathcal{R}$  dans  $\mathbf{N} \times \mathbf{N}$ . Toute classe d'équivalence est indépendante du représentant  $(x, y)$  qui la définit.

Sur  $\mathbf{N} \times \mathbf{N} / \mathcal{R}$  on définit une opération interne  $+$  de la manière suivante :

$(x, y) + (x', y') = (x + x', y + y')$  autrement dit,  $\overline{X} + \overline{Y} = \overline{X + Y}$  où  $\overline{X}$  est la classe de  $(x, y)$  et  $\overline{Y}$  celle de  $(x', y')$  ; et  $\overline{X + Y}$  ne dépend pas des représentants choisis pour  $\overline{X}$  et  $\overline{Y}$ .

En effet, si on remplace  $(x, y)$  par  $(x_1, y_1)$ , autre représentant de  $\overline{X}$ , alors la classe définie par  $(x_1 + x', y_1 + y')$  est encore  $\overline{X + Y}$  car comme  $x_1 + y = x + y_1$ , alors en ajoutant  $x' + y'$  aux deux membres de cette égalité, on obtient  $x_1 + x' + y + y' = x + x' + y_1 + y'$ . Ce qui prouve que  $(x_1 + x', y_1 + y') \mathcal{R} (x + x', y + y')$ . La démonstration est analogue pour montrer que  $\overline{X + Y}$  ne dépend pas du représentant  $(x', y')$  choisi pour  $\overline{Y}$ .

Les propriétés d'associativité et de commutativité de  $+$  dans  $\mathbf{N}$  s'étendent facilement à  $+$  dans  $\mathbf{N} \times \mathbf{N} / \mathcal{R}$ .

En effet  $(\overline{X + Y}) + \overline{Z}$  est représenté par  $((x + x') + x'', (y + y') + y'')$  qui est égal à  $(x + (x' + x''), y + (y' + y''))$  puisque l'addition dans  $\mathbf{N}$  est associative. Or ce dernier couple représente  $\overline{X} + (\overline{Y} + \overline{Z})$ .

De même,  $\overline{X} + \overline{Y}$  est représenté par  $(x + x', y + y')$ , égal à  $(x' + x, y' + y)$  car  $+$  est commutative dans  $\mathbf{N}$ , et  $(x' + x, y' + y)$  représente  $\overline{Y} + \overline{X}$ .

En désignant par  $\overline{0}$  la classe de  $(a, a)$  on a  $\overline{0} + \overline{X}$  représentée par  $(a + x, a + y)$ .

Or  $a + x + y = x + a + y$ . Donc  $(a + x, a + y) \mathcal{R}(x, y)$  et  $\overline{0} + \overline{X} = \overline{X}$ . On a alors  $\overline{X} + \overline{0} = \overline{X}$  d'après la commutativité de  $+$  dans  $\mathbf{N} \times \mathbf{N} / \mathcal{R}$ .  $\overline{0}$  est donc élément neutre de  $+$  dans  $\mathbf{N} \times \mathbf{N} / \mathcal{R}$ .

Tout élément  $\overline{X}$  de  $\mathbf{N} \times \mathbf{N} / \mathcal{R}$  admet un symétrique noté  $-\overline{X}$ , dont un représentant est  $(y, x)$ , puisque  $\overline{X} + (-\overline{X})$  est alors représenté par  $(x + y, y + x)$  représentant de  $\overline{0}$ .

Donc  $\overline{X} + (-\overline{X}) = \overline{0} = (-\overline{X}) + \overline{X}$ .

En notant  $\mathbf{N} \times \mathbf{N} / \mathcal{R} \stackrel{=}{=} \mathbf{Z}$ , on a donc démontré que  $(\mathbf{Z}; +)$  est un groupe commutatif.

## Une construction possible de $(\mathbf{Z}; +)$ par les programmes de calcul

### Préalables :

Les préalables à propos de  $\mathbf{N}$  sont ceux exposés dans la construction « classique » de  $\mathbf{Z}$ , page précédente ; soit :

- Sur  $\mathbf{N}$ , on a défini une opération interne  $+$  qui est associative, commutative et pour laquelle tout entier naturel  $n$  est régulier, c'est-à-dire :  $x + n = y + n \Leftrightarrow x = y$ .
- On a aussi défini la différence de deux nombres entiers naturels  $x$  et  $y$  lorsque  $x \leq y$  par le nombre  $d$  entier naturel tel que  $x + d = y$ . Lorsque  $x \leq y$ , la différence de  $y$  et  $x$  se note  $d = y - x$ .

On a alors pour tout entier naturel  $x$  pour lequel  $x + (b - a) \geq 0$  :

$x + (b - a) = (x + b) - a = x + b - a$  quels que soient les entiers naturels  $a$  et  $b$ .

En effet :

- **si  $a \leq b$** ,  $x + (b - a) = (x + b) - a$  puisque  $+$  est associative dans  $\mathbf{N}$  et que  $b - a \geq 0$

Si on note  $d = b - a$  ( $\Leftrightarrow d + a = b$ ) et  $d' = (x + b) - a$  ( $\Leftrightarrow d' + a = x + b$ )

Comme  $b = d + a$ , alors  $d' + a = x + d + a$ .

Comme tout élément  $a$  est régulier pour l'addition dans  $\mathbf{N}$ , alors :

$d' = x + d = x + (b - a) = (x + b) - a$

- **si  $a > b$** ,  $x + b - a = (x + b) - a$  puisque  $+$  est associative dans  $\mathbf{N}$  et qu'on a (implicitement pour les élèves) choisi  $x \geq |b - a|$  ; on reste donc dans  $\mathbf{N}$ .

On a encore  $d' + a = x + b$ , mais cette fois :  $d + b = a$ .

D'où, en remplaçant  $a$  dans  $d'$  :  $d' + d + b = x + b$ . Comme tout élément  $b$  est régulier pour l'addition dans  $\mathbf{N}$ , alors :  $d' + d = x$ . Soit  $d' = x - d = x - (b - a)$ . Ce qui prouve la possibilité du calcul dans  $\mathbf{N}$  si  $x \geq |b - a|$

**Conséquence :** dans le cas où  $a > b$ , le calcul de  $d = b - a$  n'est pas possible dans  $\mathbf{N}$ , mais le calcul de  $x + d = x + b - a$  reste possible dès lors que  $x \geq |b - a|$

**Définitions :** Etant donné les entiers naturels  $a$  et  $b$  :

- on appelle opérateur dans  $\mathbf{N}$  la fonction de  $\mathbf{N}$  dans  $\mathbf{N}$  notée  $\mathcal{O}(a, b)$  définie de la manière suivante :  
si  $a \leq b$  alors  $\mathcal{O}(a, b)(x) = x + (b - a)$ , et si  $a > b$  alors  $\mathcal{O}(a, b)(x) = x - (a - b)$ .
- Si  $a < b$  on dit que  $\mathcal{O}(a, b)$  ajoute  $b - a$ , et si  $a > b$ , on dit que  $\mathcal{O}(a, b)$  soustrait  $a - b$ .

On a Déf.  $\mathcal{O}(a, b) = \mathbf{N}$  si  $a \leq b$ , et Déf.  $\mathcal{O}(a, b) = \{x \in \mathbf{N} / x \geq a - b\}$  si  $a > b$ .

Soit  $\mathcal{O}$  l'ensemble des opérateurs ainsi définis.

### Relation d'équivalence dans $\mathcal{O}$ :

On considère sur  $\mathcal{O}$  la relation  $\mathcal{R}$  définie par  $\mathcal{O}(a, b) \mathcal{R} \mathcal{O}(c, d) \Leftrightarrow$  quel que soit l'entier naturel  $x$  :  $\mathcal{O}(a, b)(x) = \mathcal{O}(c, d)(x)$ , c'est-à-dire quel que soit  $x$  entier naturel pour lequel les calculs sont possibles dans  $\mathbf{N}$  :  $x + b - a = x + d - c$ . Cette relation est une relation d'équivalence dans  $\mathcal{O}$  car la relation d'égalité est une relation d'équivalence dans  $\mathbf{N}$ .

**Définition :** Un nombre relatif est une classe d'équivalence de  $\mathcal{O}$  dans  $\mathcal{O}$ . Toute classe d'équivalence est indépendante du représentant  $\mathcal{O}(a, b)$  qui la définit.

### Addition des relatifs :

#### Définition et indépendance des représentants choisis

Sur  $\mathcal{O} \times \mathcal{O} / \mathcal{R}$  on définit une opération interne  $+$  de la manière suivante :

$\mathcal{O}(a, b) + \mathcal{O}(a', b') = \mathcal{O}(a + a', b + b')$  autrement dit,  $\overline{X} + \overline{Y} = \overline{X + Y}$  où  $\overline{X}$  est la classe de  $\mathcal{O}(a, b)$  et  $\overline{Y}$  celle de  $\mathcal{O}(a', b')$ ; et  $\overline{X + Y}$  ne dépend pas des représentants choisis pour  $\overline{X}$  et  $\overline{Y}$ .

En effet, si on remplace  $(a, b)$  par  $(a_1, b_1)$ , autre représentant de  $\overline{X}$ , alors la classe définie par  $\mathcal{O}(a_1 + a', b_1 + b')$  est encore  $\overline{X + Y}$  car, comme quel que soit  $x$  entier naturel pour lequel les calculs sont possibles dans  $\mathbf{N}$  :  $x + b_1 - a_1 = x + b - a$ , alors en ajoutant  $x + b' - a'$  aux deux membres de cette égalité, on obtient  $2x + (b_1 + b') - (a_1 + a') = 2x + (b + b') - (a + a')$ . Ce qui prouve que  $\mathcal{O}(a_1 + a', b_1 + b') \mathcal{R} \mathcal{O}(a + a', b + b')$ . La démonstration est analogue pour montrer que  $\overline{X + Y}$  ne dépend pas du représentant  $\mathcal{O}(a', b')$  choisi pour  $\overline{Y}$ .

### Associativité et commutativité de + dans $\mathcal{O} \times \mathcal{O} / \mathcal{R}$

Les propriétés d'associativité et de commutativité de + dans  $\mathbf{N}$  s'étendent facilement à + dans  $\mathcal{O} \times \mathcal{O} / \mathcal{R}$ .

En effet  $(\overline{X} + \overline{Y}) + \overline{Z}$  est représenté par  $\mathcal{O}((a + a') + a'', (b + b') + b'')$  qui est égal à  $\mathcal{O}(a + (a' + a''), b + (b' + b''))$  puisque l'addition dans  $\mathbf{N}$  est associative. Or ce dernier couple représente  $\overline{X} + (\overline{Y} + \overline{Z})$ .

De même,  $\overline{X} + \overline{Y}$  est représenté par  $\mathcal{O}(a + a', b + b')$ , égal à  $\mathcal{O}(a' + a, b' + b)$  car + est commutative dans  $\mathbf{N}$ , et  $\mathcal{O}(a' + a, b' + b)$  représente  $\overline{Y} + \overline{X}$ .

### Élément neutre de + dans $\mathcal{O} \times \mathcal{O} / \mathcal{R}$

En désignant par  $\overline{0}$  la classe de  $\mathcal{O}(a, a)$  on a  $\overline{0} + \overline{X}$  représentée par  $\mathcal{O}(a + a', a + b')$ . Or, quel que soit l'entier naturel  $x$  pour lequel les calculs sont possibles :

$$\begin{aligned} \mathcal{O}(a + a', a + b')(x) &= x + (a + b') - (a + a') \\ &= x + a + b' - a - a' \\ &= x + b' - a' \\ &= \mathcal{O}(a', b')(x). \end{aligned}$$

Donc  $\mathcal{O}(a + a', a + b') \mathcal{R} \mathcal{O}(a', b')$  et  $\overline{0} + \overline{X} = \overline{X}$ . On a alors  $\overline{X} + \overline{0} = \overline{X}$  d'après la commutativité de + dans  $\mathcal{O} \times \mathcal{O} / \mathcal{R}$ .  $\overline{0}$  est donc élément neutre de + dans  $\mathcal{O} \times \mathcal{O} / \mathcal{R}$ .

### Élément symétrique de tout élément $\overline{X}$

Tout élément  $\overline{X}$  de  $\mathcal{O} \times \mathcal{O} / \mathcal{R}$  admet un symétrique noté  $-\overline{X}$ , dont un représentant est  $(b, a)$ , puisque  $\overline{X} + (-\overline{X})$  est alors représenté par  $\mathcal{O}(a + b, b + a)$  représentant de  $\overline{0}$ .

$$\text{Donc } \overline{X} + (-\overline{X}) = \overline{0} = (-\overline{X}) + \overline{X}.$$

En notant  $\mathcal{O} \times \mathcal{O} / \mathcal{R} = \mathbf{Z}$ , on a donc démontré que  $(\mathbf{Z}; +)$  est un groupe commutatif.

Yves Matheron